


نمونه برداری از بافت داخلی رحم




سطح داخلی رحم از بافتی فعال به نام اندومتر پوشیده شده است. این بافت حساس به تغییرات هورمونی است و پس از بلوغ تا پیش از یائسگی در هردوره قاعدگی ریزش می کند و خونریزی (عادت)، ماهیانه را شکل می دهد. پس از پایان خونریزی این بافت مجدداً تشکیل می شود. تغییرات بافت داخلی رحم (اندومتر) فضای رحم را برای پذیرش جنین در صورت حاملگی و لانه گزینی آن آماده می کند.

نمونه برداری از بافت داخلی رحم (اندومتر) یک روش تشخیصی است که با برداشت و معاینه بافت داخلی رحم (اندومتر) که شامل لایه پوشاننده رحمی، گردن رحم و واژن است انجام می گردد.

این روش تشخیصی به دلایل زیر انجام می شود

- معاینه ی علت خونریزی بیش از حد ، در طی دوره های قاعدگی و یا بین آنها
- بررسی علت خونریزی پس از قاعدگی



روش انجام نمونه برداری

در این روش بیمار صاف به پشت می خوابد و پاها رو به بالا و در محلی مناسب قرار می گیرد. پزشک وسیله ای به نام اسپکولوم (قاشقک) را وارد واژن می کند. این وسیله در داخل گردن رحم به سمت رحم کشیده می شود و نمونه گیری انجام می گیرد. این روش معمولاً در مراکز درمانی و جراحی سرپایی و یا در بیمارستان انجام

می شود و معمولاً پس از انجام آن فرد می تواند به خانه برود.

مواردی که باید پیش از انجام نمونه برداری به اطلاع پزشک رسانده شود

- لیست کاملی از داروهایی که مصرف می کنید.
- اگر به دارو یا غذای خاصی حساسیت دارید اطلاع دهید.
- اگر داروهای رقیق کننده خون استفاده می کنید مثل آسپرین، وارفارین، مکمل های گیاهی و یا سایر داروها به پزشک خود اطلاع دهید.
- اگر خودتان و یا یکی از بستگان سابقه بیماری ها و یا اختلالات خونریزی دهنده دارید.
- اگر دیابت، فشارخون بالا، درد قفسه سینه و یا سابقه حملات قلبی دارید.
- اگر شرح حالی از شکستگی های استخوانی مکرر برای شما وجود دارد.



دانشگاه علوم پزشکی شیراز
مرکز آموزشی درمانی شهید دکتر فقیهی



نمونه برداری از بافت داخلی رحم

ویژه آموزش به بیمار

تهیه کننده

لیلا منصورآبادی- کارشناس پرستاری

تایید کننده

دکتر زهرا شیروانی

(متخصص و جراح زنان و زایمان- فلوشیپ آنکولوژی)

منابع

بارداری و زایمان ویلیامز ۲۰۲۱

تابستان ۱۴۰۴

EDU-PT-113/B



عوارض اندومتريال بیوپسی

-افزایش خونریزی

- پاره شدن رحم

- عفونت لگن

- عفونت خون

کورتاژ به عنوان درمان جایگزین این روش می-
باشد که در مقایسه، نمونه برداری از بافت داخلی
رحم کم خطر تر است.

اگر جراحی های دیگری هم برای شما انجام شده
است.

مراقبت های بعد از انجام نمونه برداری

- از داروهای ضد التهاب طبق تجویز پزشک می
توان استفاده کرد .

- تامپون واژن برای مدت ۱۴ روز استفاده نشود.

- فعالیت جنسی برای مدت ۱۴ روز نداشته
باشند.

در صورت بروز علائم زیر به پزشک مراجعه کنید

-تب

- دردهای زیر شکم بیشتر از ۴۸ ساعت بعد از
انجام نمونه برداری

- افزایش درد

- خونریزی بیش از حد طبیعی قاعدگی

- ترشح بدبو