

داروی آپیکسابان Apixaban چیست؟

آپیکسابان و ریواروکسابان، داروی ضد انعقاد نسل جدید هستند که جهت درمان و پیشگیری از اختلالات انعقادی که منجر به ایجاد لخته خون در رگ های بدن می شوند، استفاده می شود. این داروها جایگزین پلاویکس نبوده و بعنوان یک داروی جدید می باشد.

موارد مصرف

- پیشگیری از حوادث ترومبولیتیک بعد از جراحی های لگن و زانو
- پیشگیری از سکنه مغزی و آمبولی سیستمیک در بیماران مبتلا به فیبریلاسیون دهلیزی غیر دریچه ای
- درمان DVT و آمبولی ریه

مکانیسم اثر دارو

این داروها باعث مهار فعالیت پلاکت و تشکیل لخته فیبرینی از طریق مهار مستقیم، انتخابی و برگشت پذیر فاکتور Xa در هر دو مسیر انعقادی داخلی و خارجی می شود.

مزایای دارو

- خوراکی بودن دارو

- مصرف تنها یک بار در روز
- در ریواروکسابان و دو بار در روز در آپیکسابان

- عدم نیاز به آزمایشات مکرر انعقادی
- تداخلات کمتر دارو با غذاها و داروها

موارد احتیاط

- دارو در حاملگی و شیردهی قابل استفاده نیست. همچنین در بیمارانی که نارسائی شدید کلیه دارند، مصرف این دارو توصیه نمی شود.
- در بیماران مبتلا به اختلال متوسط تا شدید کبدی این دارو نباید مصرف شود.
- در بیماران مبتلا به اختلال متوسط کلیوی با احتیاط مصرف شود.

موارد منع مصرف

- حساسیت شدید به دارو یا سایر ترکیبات فرمولاسیون
- خونریزی فعال ناشی از بیماری
- سن کمتر از ۱۸ سال
- در دوران بارداری و شیردهی

- در صورت نارسایی کبد متوسط تا شدید

تداخلات دارویی

- مصرف همزمان این دارو با داروهای زیر می تواند خطرناک باشد: کتوکونازول، ایتراکونازول، وریکونازول، ریتوناویر، فنی توئین، کاربامازپین، ریفامپین اجتناب شود.
- همین طور مصرف توأم ریواروکسابان با سایر داروهایی که ریسک خونریزی را افزایش می دهند(نظیر آنتی پلاکت ها) ریسک خونریزی را بیشتر می کند. بنابراین باید در انتخاب بیمارانی که به طور همزمان نیاز به آنتی پلاکت و آنتی کوآگولانت (ریواروکسابان، وارفارین و...) دارند، دقت شود.
- مصرف توأم مهار کننده های ضد التهاب (NSAIDs) غیر استروئیدی با ریواروکسابان، باعث افزایش ریسک



دانشگاه علوم پزشکی شیراز

مرکز آموزشی درمانی شهید دکتر فقیهی

داروی آپیکسابان (Apixaban) و

ریواروکسابان (Rivaroxaban)

ویژه آموزش به بیمار

تهیه کننده:

راحله مصلی نژاد- کارشناس پرستاری

افسون توفیق - کارشناس ارشد پرستاری

تایید کنند ه:

دکتر حامد بذرافشان (متخصص قلب و عروق)

منابع:

<http://www.fierrecbiotech.com/press-releases/>

bayers-xarelto-approved-canada

بهار ۱۴۰۴

EDU-PT-226/A



طول درمان با دارو

طول درمان با دارو بسته به نظر پزشک معالج و با توجه به ارزیابی نوع بیماری و شرایط جسمانی بیمار تعیین می گردد.

شرایط نگهداری دارو

- در دمای اتاق، بین ۲۰ تا ۲۵ درجه سانتیگراد
- دور از دسترس اطفال

خونریزی شده و بهتر است اجتناب شود.

عوارض جانبی دارو

- قلبی عروقی: ادم محیطی
- سیستم عصبی مرکزی: سردرد، گیجی، تب
- پوستی: کبودی، خارش، راش
- گوارشی: یبوست، اسهال، درد شکمی، تهوع
- تناسلی ادراری: وجود خون در ادرار
- خونی: خونریزی، ترومبوسیتوپنی، هماتوم، آنمی
- کبدی: افزایش آنزیمهای کبدی و بیلی روبین
- موضعی: ترشح از زخم
- عصبی عضلانی و اسکلتی: درد اندام ها، اسپاسم عضلانی
- تنفسی: خون دماغ شدن، خلط خونی