

برونکوسکوپي

برونکوسکوپي اقدام تشخيصي و گاهي درماني است.

لوله دستگاه برونکوسکوپ از بيني يا دهان وارد راه های هوایی شده و از طريق آن پزشک قادر به مشاهده مستقيم مجاری هوایی می باشد.

برونکوسکوپي هنگامی انجام می شود که پزشک علاوه بر شرح حال، معاینه، عکس قفسه سينه و سی تی اسکن، نیاز به بررسی دقيق تر راههای هوایی و يا اقدامات درماني دارد، انجام می شود.




Figure 8

موارد زیر را قبل از انجام برونکوسکوپي رعایت

کنید

- قبل از انجام برونکوسکوپي بیمار يا کسی که کفالت او را به عهده دارد باید برگه رضایت عمل را به دقت خوانده و سپس امضاء کند .

نکته

در صورت داشتن هر گونه حساسیت دارویی به پزشک و پرستار خود اطلاع دهید.

داشتن مدارک زیر جهت انجام برونکوسکوپي در

بیماران سرپایي الزامی است

- دستور پزشک متخصص ریه بیمارستان
- گرافي قفسه سينه
- سی تی اسکن ریه

موارد زیر را در حین انجام برونکوسکوپي برای

شما انجام می شود

- داروی بی حسی موضعی به صورت اسپری در دهان شما استفاده می شود.
- در صورت نیاز اکسیژن از طريق سوند بيني برای شما گذاشته می شود .
- از دستگاهی به نام پالس اکسی متر جهت اندازه گیری میزان اکسیژن اشباع شده خون شریانی استفاده می شود . که به صورت گیره نوک انگشت متصل شده و داخل آن یک منبع نوری است.

- داشتن یک نفر همراه الزامی است .
- یک جعبه دستمال کاغذی همراه خود داشته باشید.
- لاک ناخن خود را پاک کنید .
- شب قبل از برونکوسکوپي آقایان بهتر است صورت خود را اصلاح کنند .
- از ۸ ساعت قبل از انجام برونکوسکوپي باید ناشتا باشید .
- در صورت داشتن قطعات فلزی ، دندان مصنوعی، لنزهای چشمی و زیور آلات ، آنها را خارج کنید .

- در صورتی که داروی خاصی مصرف می کنید مانند داروهای ضد انعقاد، داروهای قلبی و ضد فشار خون، آسپرین و داروی کاهش دهنده قندخون و ...به پزشک و پرستار خود اطلاع دهید .



دانشگاه علوم پزشکی شیراز

مرکز آموزشی درمانی شهید دکتر فقیهی

برونکوسکوپی

ویژه آموزش به بیمار

تهیه کننده:

افسون توفیق - کارشناس ارشد پرستاری

تایید کننده:

دکتر لیلا ظهیری

(متخصص داخلی - فوق تخصص بیماریهای ریه و

مراقبت های ویژه)

منابع:

پرستاری داخلی جراحی برونسودارث ۲۰۲۱

تابستان ۱۴۰۴

EDU-PT-03/B



در صورت بروز یکی از نشانه های زیر بعد از انجام برونکوسکوپی به پزشک مراجعه کنید

- خونریزی به صورت خلط خونی شدید
- کاهش فشار خون
- افزایش ضربان قلب
- بی قراری
- کبود شدگی
- سیاه شدن نوک انگشتان و لب ها
- تنگی نفس
- کاهش سطح هوشیاری
- نا منظم شدن ضربان قلب

عوارض این آزمایش

ایست تنفسی، کاهش اکسیژن خون، خونریزی از محل نمونه برداری، سوراخ شدگی ریه و جمع شدن هوا اطراف ریه

درمان جایگزین

سی تی اسکن، نمونه برداری تحت راهنمایی سونوگرافی یا سی تی اسکن

موارد زیر را بعد از انجام برونکوسکوپی رعایت کنید

- بیماران سر پایی به مدت نیم ساعت در بخش برونکوسکوپی تحت نظرمی باشند.
- تا وقتی که بتوانید آب دهان خود را قورت دهید نباید از راه دهان چیزی بخورید، این زمان معمولاً ۱ الی ۲ ساعت بعد از انجام برونکوسکوپی طول می کشد.
- احتمال گرفتگی صدا و یا وجود رگه های خون می تواند بعد از برونکوسکوپی بصورت کم وموقت ایجاد شود.
- بهتر است برای شروع خوردن، از مایعات استفاده کنید.
- در بیمارانی که به صورت سر پایی مراجعه می کنند، نمونه توسط همراه بیمار به آزمایشگاه و پاتولوژی برده می شود.