

لیشمانیاز سی

بیماری است که بوسیله انگل تک یافته ای از جنس لیشمانیا ایجاد می شود. انسان ها با گزش پشه خاکی آلوده می شوند. این پشه در جنگل، غارها و بر روی بدن جوندگان کوچک به عنوان عامل وجود دارد. ۴ نوع بیماری در اثر ابتلا به این انگل ایجاد می شود.

نوع پوستی و منتشر

در مناطقی که در معرض گزش پشه قرار می گیرند منجر به ایجاد زخم هایی مزمن و منتشر در صورت است و پاها می گردد و معمولا ضایعات پوستی طی چند ماه بعد بهبود می یابد و ممکن است جای زخم بر جا نماند ولی درمان ضایعات پوستی منتشر مشکل است.

نوع پوستی مخاطی

ضایعات به طور نسبی یا کامل غشاهای مخاط بینی، دهان و بافت های اطراف را تخریب می کند. که علائم آن شامل گرفتگی بینی، آبریزش یا خونریزی از بینی، اختلال در بلع و زخم هایی در دهان، زبان، لثه، لبها و بینی و داخل بینی است.

نوع احشایی

کالاآزر (kala azar) نامیده می شود با تب بالا، کاهش وزن، بزرگ شدن سائز کبد و طحال و کم خونی (آنمی) مشخص می شود که علائم آن شامل: درد شکم، تب طولانی مدت، تعریق شبانه، پوسته پوسته شدن و تیره شدن پوست، نازک شدن مو و کاهش وزن می باشد.

تشخیص

نمونه برداری پوست، نمونه برداری و کشت از طحال، نمونه برداری و کشت از مغز استخوان و آزمایشاتی که مانند چک سلولهای خون (CBC)،

تست های سرولوژی، سطح ایمونوگلوبین، سرم و آلبومین می باشد.

درمان

- گلوکانتیم برای ۳-۲ هفته (تزریق عضلانی و داخل ضایعه ای) اگر تعداد آمپول ها زیاد باشد (در افراد چاق) باید تزریق دو طرفه صورت گیرد.

- فلوکونازول به صورت قرص خوراکی به مدت ۳۰ روز

- آزیترومایسین صورت قرص خوراکی به مدت ۳۰ روز

- کرایوتراپی یک بار در هفته

- آمفوتریسین بی

- لیزر درمانی



دانشگاه علوم پزشکی شیراز
مرکز آموزش درمانی شهید دکتر فقیهی

لیشمانیازیس

ویژه آموزش به بیمار

تهیه کننده

راضیه توانا - کارشناس پرستاری

تایید کننده

دکتر نگین فاضل زاده حقیقی
(متخصص پوست و مو، زیبایی و لیزر)

منابع

WWW.mnby.con. Com
Haniet 2021

تابستان ۱۴۰۴

EDU-PT-116/B



عفونت کمک بسیار موثری در درمان نموده و
طول بیماری را کاهش می دهد.

- جهت کاهش خارش از کالامین یا لوسیون های
ضد خارش دیگر استفاده کنید.

- بدلیل جلوگیری از آسیب های کلیوی حتما باید
میزان مصرف مایعات خوراکی و تزریقی و
همچنین میزان ادرار با دقت اندازه گیری شود.

- در مصرف طولانی مدت آمپول برای پی بردن به
ورم احتمالی باید روزانه وزن بیمار چک شود.

مراقبت های پرستاری

-بدلیل مصرف آمفوترسین B چک علائم حیاتی
هر ۳۰-۱۵ دقیقه لازم می باشد.

-قبل از تزریق آمپول گلوکانتیم با گرفتن نوار قلب
از وضعیت طبیعی کارکرد قلب آگاه شوید.

- در داروی فلوکونازول بیمار را باید از نظر
مسمومیت کبدی مد نظر قرار دهید. به همین
خاطر آزمایش چک فعالیت های کبدی حتما
هفته ای انجام شود.

- شستشو با پرمنگنات پتاسیم به مدت ۲۰ دقیقه
دو تا سه بار در روز برای خشک شدن ترشحات
سطح زخم شما بسیار موثر است پس از شستشو
باید زخم را با پمادهای توصیه شده توسط پزشک
مانند موپیروسین پانسمان کنید.

- آنتی بیوتیک تزریقی جهت درمان عفونت سوار
شده یا گاهی جهت پیشگیری از سوار شدن