

اندوسکوپی

از طریق اندوسکوپی پزشک می تواند مری، معده و دوازدهه (اثنی عشر) شما را به وضوح ببیند.

این تست برای افرادی استفاده می شود که:


- مشکلات گوارشی مانند سوزش سر دل، درد شکم و علائم خونریزی گوارشی دارند انجام می شود.
- تشخیص زخم، پولیپ و توده های دستگاه گوارش فوقانی
- گاهی از این تست در مواردی که غذا یا جسم خارجی در مری گیر کرده باشد استفاده می شود.
- در موارد کنترل خونریزی و برداشتن پولیپ نیز استفاده می شود.

روش انجام اندوسکوپی

روش انجام این فرایند بصورتی است که یک لوله قابل انعطاف (مجهز به منبع نور و گیرنده ویدئویی) را از طریق دهان وارد دستگاه گوارش می کنند. علاوه بر

مشاهده داخلی دستگاه گوارش توسط این روش، امکان نمونه برداری از مخاط نیز وجود دارد.

آندوسکوپ معده و قسمت فوقانی دستگاه گوارش



آمادگی های قبل از اندوسکوپی

- ۸ ساعت قبل از اندوسکوپی از خوردن و ۲ ساعت قبل از اندوسکوپی از آشامیدن پرهیز کنید. ۱ تا ۲ ساعت قبل از اندوسکوپی نوشیدن مایعات شفاف بلا مانع می باشد. (به استثناء داروهای تجویز شده توسط پزشک).
- در موارد اورژانس محتویات معده توسط دستگاه مکنده (ساکشن) تخلیه خواهد شد.
- در صورت مصرف داروهای ضد انعقادمثل وارفارین، آسپرین و پلاویکس پزشک خود را مطلع نمایید.

- دندان مصنوعی قبل از انجام فرایند از دهان خارج گردد.
- مدارک پزشکی شامل اندوسکوپی های قبلی و جواب آزمایشات خود را همراه داشته باشید.

مراحل حین اندوسکوپی

- ابتدا شما روی تخت دراز خواهید کشید. در صورتی که نیاز به تزریق داروهای آرامبخش احساس شود، پرستار برای شما یک راه وریدی باز می کند (رگ می گیرد) و آن را به سرم وصل می کند و داروی آرامبخش از طریق سرم به شما تزریق می شود، که البته در غالب مواد اندوسکوپی بدون نیاز به تزریق داروهای آرامبخش انجام می شود.
- در مرحله بعد داروی بی حسی به درون حلق شما اسپری خواهد شد این دارو مزه بدی دارد و ممکن است احساس بی حسی و تورم در حلق داشته باشید.
- مطمئن باشید در حین انجام آزمایش تنفس شما دچار مشکل نخواهد شد.



دانشگاه علوم پزشکی شیراز
مرکز آموزشی درمانی شهید دکتر فقیهی

اندوسکوپی

ویژه آموزش به بیمار

تهیه کننده

مرجان دبیریان - کارشناس پرستاری

تایید کننده

دکتر علی شهسواری

(متخصص داخلی - فوق تخصص گوارش و کبد)

منبع

پرستاری داخلی جراحی برونسودارت ۲۰۲۱


تابستان ۱۴۰۴

EDU-PT-19/B



عوارض و خطرات احتمالی

در موارد بسیار نادری احتمال بروز خونریزی، آسیب به روده، معده و مری وجود دارد.



درمان جایگزین

در اغلب اوقات سایر تستهای تشخیصی مانند عکسبرداری یا سونوگرافی نمی توانند اطلاعات مشابه اندوسکوپی را در اختیار پزشک و بیمار قرار دهند و جایگزین مناسبی نیستند.

- با قرار دادن یک محافظ در دهان از دندانهای شما محافظت خواهد شد.
- به هنگام وارد شدن لوله و انجام معاینه در شکم احساس پری خواهید کرد.
- تنفس و فشار خون شما در طی انجام آزمایش تحت نظر خواهد بود.

پس از انجام اندوسکوپی ممکن است

- احساس تورم در ناحیه حلق و مشکل بلع داشته باشید که در این حالت، گذراست و پس از رفع آن می توانید با مشورت پزشک، غذا مصرف نمایید.
- در صورت استفاده از داروی آرام بخش (میدازولام) حین اندوسکوپی تا ۲۴ ساعت از رانندگی و انجام کارهایی که نیاز به هوشیاری دارند خودداری فرمایید.