



داروی زولادکس

نام علمی دارو (ژنریک): **Goserelin**

نام تجاری: زولادکس (**zoladex**)

گروه دارویی: هورمون های هیپوتالاموس و هیپوفیز

شکل دارویی: **Implant**

داروی زولادکس یا گوسرلین نوعی هورمون است که در زنان برای درمان سرطان پستان و اندومتریوز و درمان خونریزی های رحمی استفاده می شود.

مواردی که قبل از مصرف دارو باید به پزشک اطلاع داده شود:

- حساسیت به دارو یا مواد غذایی و ...

- بارداری یا تصمیم به بارداری و شیردهی

- بیماریهای زمینه ای و داروهای مصرفی

عوارض جانبی دارو که باید به پزشک اطلاع داده شود:

- واکنش حساسیتی مانند کهیر، خارش، تورم (لب، زبان، دهان و حلق)،

- قرمزی، تاول و پوسته ریزی و آکنه

- علائم افزایش فشار خون بالا مانند سردرد و سرگیجه

- افزایش وزن و تورم در دست ها و پاها

- عدم تعادل، ضعف عضلانی و گیجی

- سردرد

- اضطراب و هیجان

- تعریق

- تغییر در ضربان قلب

- علائم شبیه سرماخوردگی
- درد یا سوزش در هنگام ادرار کردن و درد در ناحیه لگن
- خارش در ناحیه واژن
- خونریزی غیر طبیعی واژن و ادامه دار بودن سیکل قاعدگی
- تغییر در تمایلات جنسی
- ناراحتی های گوارشی و یبوست
- اشکال در تنفس و تنفس کوتاه
- سردرد
- تغییر در سطح کلسیم خون بخصوص در بیماران مبتلا به بدخیمی
- دردهای استخوانی

اطلاعات مهم در مورد داروی زولادکس

- این دارو در طی بارداری نباید مصرف شود و در طی دوره مصرف دارو و ۱۲ هفته پس از شروع دارو، بیمار باید روش های پیشگیری از بارداری غیر هورمونی داشته باشد چرا که پیشگیری از بارداری با روش های قبلی بیمار، همزمان با درمان، اطمینان بخش نیستند.
- پیش از شروع مصرف این دارو ضروری است که فرد مصرف کننده اگر بیماری هایی نظیر دیابت، پوکی استخوان، مشکلات ستون فقرات، مشکلات قلبی، سکتة مغزی، فشار خون بالا، کلسترول بالا، اضافه وزن، خونریزی غیر طبیعی و یا هرگونه مشکلات در هنگام ادرار کردن، مصرف سیگار و ... دارد به پزشک معالج خود اطلاع دهد.
- در بیماران دیابتی و در معرض خطر دیابت، احتمال افزایش قند خون، با مصرف این دارو را داریم، پس قند خون بیمار به طور منظم مورد بررسی قرار گیرد.

- در هنگام مصرف این دارو باید از مصرف الکل و یا نوشیدنی‌های الکلی و استعمال سیگار اجتناب شود.
- این دارو می‌تواند از طریق مایعات بدن فرد دریافت کننده (ادرار، مدفوع، استفراغ) دفع شود. یکی از نکات مهم برای افراد مراقب این است که لباس‌های کثیف و یا پارچه‌ای فرد بیمار به طور جداگانه از سایر لباس‌ها شسته شود.
- بدلیل عوارض جانبی و جدی دارو برای طفل شیرخواری که مادر در حال درمان با دارو دارد، یا باید تصمیم به قطع شیردهی توسط مادر صورت گیرد و یا تصمیم به قطع درمان بر اساس اهمیت درمان مادر صورت گیرد.
- در خانم‌ها این دارو باعث پیشگیری از بارداری نمی‌شود و در نتیجه در زمان مصرف دارو، استفاده از کاندوم پیشنهاد می‌شود.
- این دارو برای جنین مضر بوده پس بیمار قبل از استفاده از دارو، تست بارداری منفی داشته باشد.
- در هنگام مراجعه به پزشک، مصرف این دارو را یادآوری نمایید.
- سطح هورمون‌ها در چند هفته اول مصرف دارو افزایش یافته و علائم بیماری ممکن است بدتر شود، در صورت بروز علائم جدید و ماندگاری بیش از چند هفته به پزشک مراجعه شود.
- کاهش سطح هورمون باعث اثراتی چون کاهش سائز پستان، حساس شدن پستان، کاهش تمایل به رابطه جنسی، گرگرفتگی و تعریق می‌شود؛ این موارد را به پزشک خود اطلاع دهید.
- در صورت بالا رفتن قند خون به پزشک اطلاع دهید.
- مصرف طولانی مدت با دارو باعث ضعف استخوان می‌شود، پس باید تست تراکم استخوان انجام شود.

واحد آموزش به بیمار

EDU-PT-292/A