


## تعریف برونکوسکوپي و منافع آن:

برونکوسکوپي اقدام تشخیصی و گاهی درمانی است. لوله دستگاه برونکوسکوپ از بینی یا دهان وارد راه های هوایی شده و از طریق آن پزشک قادر به مشاهده مستقیم داخل مجاری هوایی می باشد. ( شکل ۱ ) برونکوسکوپي هنگامی انجام می شود که پزشک علاوه بر شرح حال ، معاینه ، عکس قفسه سینه و سی تی اسکن نتواند تشخیص قطعی بیماری ریوی را بدهد.



شکل ۱

Figure 1

## موارد زیر را قبل از انجام برونکوسکوپي

### رعایت کنید :

➤ قبل از انجام برونکوسکوپي بیمار یا کسی که کفالت او را به عهده دارد باید برگه رضایت عمل را به دقت خوانده و سپس امضاء کند .

➤ داشتن یک نفر همراه الزامی است .

➤ یک جعبه دستمال کاغذی همراه خود داشته باشید.

➤ لاک ناخن خود را پاک کنید .

➤ شب قبل از برونکوسکوپي آقایان بهتر است صورت خود را اصلاح کنند .

➤ از ۸ ساعت قبل از انجام برونکوسکوپي باید ناشتا باشید .

➤ در صورت داشتن قطعات فلزی ، دندان مصنوعی ، لنزهای چشمی و زیور آلات ، آنها را خارج کنید .

➤ در صورتی که داروی خاصی مصرف می کنید مانند داروهای ضد انعقاد ، داروهای قلبی ، ضد فشار خون بالا ، آسپرین و داروی کاهش دهنده قندخون و ... به پزشک و پرستار خود اطلاع دهید .

### نکته:

در صورت داشتن هر گونه حساسیت دارویی به

پزشک و پرستار خود اطلاع دهید.

## داشتن مدارک زیر جهت انجام

## برونکوسکوپي در بیماران سرپایی الزامی

### است:

➤ دستور پزشک متخصص ریه بیمارستان

➤ گرافی قفسه سینه

➤ سی تی اسکن ریه

## موارد زیر را در حین انجام برونکوسکوپي

### برای شما انجام می شود :

داروی بی حسی موضعی به صورت اسپری در دهان شما استفاده می شود.

در صورت نیاز اکسیژن از طریق سوند بینی برای شما گذاشته می شود .

از دستگاهی به نام پالس اکسی متر جهت اندازه گیری میزان اکسیژن اشباع شده خون شریانی استفاده می شود . که به صورت گیره نوک انگشت متصل شده و داخل آن یک منبع نوری است.

## موارد زیر را بعد از انجام برونکوسکوپي

### رعایت کنید :



دانشگاه علوم پزشکی شیراز

مرکز آموزشی درمانی شهید دکتر فقیهی

### برونکوسکوپي

ویژه آموزش به بیمار

تهیه کننده:

شهربانو ممتحن - کارشناس پرستاری

تایید کننده: دکتر سید محمد علی قیومی

( فوق تخصص بیماریهای ریه )

منابع:

فیپس ، لانگ، وودز ، کاسمیر ، پرستاری

بیماریهای دستگاه تنفسی

برونر سودارث ، پرستاری داخلی

جراحی بیماریهای تنفسی سال ۲۰۱۸

تابستان ۱۴۰۰

EDU-PT-03/B

- سیاه شدن نوک انگشتان و لب ها
- تنگی نفس
- عدم آگاهی
- نا منظم شدن ضربان قلب

### عوارض این آزمایش:

ایست تنفسی، کاهش اکسیژن خون، خونریزی از محل نمونه برداری، سوراخ شدگی ریه و جمع شدن هوا اطراف ریه

### درمان جایگزین:

سی تی اسکن، نمونه برداری تحت راهنمایی سونوگرافی یا سی تی اسکن

بیماران سر پایی به مدت نیم ساعت در بخش برونکوسکوپي تحت نظرمی باشند.

تا وقتی که بتوانید آب دهان خود را قورت دهید نباید از راه دهان چیزی بخورید، این زمان معمولاً ۱ الی ۲ ساعت بعد از انجام برونکوسکوپي طول می کشد.

احتمال گرفتگی صدا ، زخم گلو و یا وجود رگه های خون می تواند بعد از برونکوسکوپي بصورت کم وموقت ایجاد شود.

بهتر است برای شروع خوردن، از مایعات استفاده کنید.

در بیمارانی که به صورت سر پایی مراجعه می کنند، نمونه توسط همراه بیمار به آزمایشگاه و پاتولوژی برده می شود .

### در صورت بروز یکی از نشانه های زیر بعد از انجام

### برونکوسکوپي به پزشک مراجعه کنید :

- خونریزی به صورت خلط خونی شدید با علائم بی قراری
- کاهش فشار خون
- افزایش ضربان قلب
- بی قراری
- کبود شدگی