

قلب انسان از چهار حفره تشکیل شده است. در سمت راست قلب، دهلیز راست و بطن راست و در سمت چپ دهلیز چپ و بطن چپ قرار گرفته است. دریچه میترال بین دهلیز و بطن چپ قرار دارد.

این دریچه ممکن است دچار تنگی شود که از علل آن می توان به تب روماتیسمی، رسوب کلسیم بر روی دریچه، عفونتها و ... اشاره کرد.

علائم تنگی دریچه میترال :

- تنگی نفس هنگام استراحت
- سرفه گاهی همراه با خلط خونی
- خستگی مفرط

عوارض بیماری:

- بی نظمی ضربان قلبی
- احتمال تشکیل لخته در قلب
- التهاب بافت داخلی قلب

درمان:

دارو، بالون، عمل جراحی. دارو درمانی از درمانهای شایع این بیماری می باشد.

درمان با بالون:

در این روش که غیر جراحی بوده، با استفاده از یک کنتر که یک بادکنک(بالون) در سر آن قرار دارد، از طریق عروق خونی کشاله ران، وارد شده و کنتر تا محل تنگی پیش رفته و در آنجا بالون باد می شود و در نتیجه محل تنگی باز شده و بالون از بدن خارج می گردد.

مراقبت قبل از انجام بالون:

بیمار معمولا روز قبل از بالون زدن باید در بخش بستری شده و از نظر نوار قلب، عکس قفسه سینه، آزمایشات و..... بررسی شود.

مراقبت بعد از انجام بالون:

- بیمار باید ۴۸-۲۴ ساعت در بیمارستان بستری باشد.
- استراحت مطلق ۱۲ ساعت بعد از بالون.
- تا ۶ ساعت بعد از بالون از کیسه شن استفاده شود تا از خونریزی جلوگیری شود.
- در صورت نیاز به دستشویی از ظرف مخصوص استفاده شود.
- در صورت بروز خونریزی از ناحیه عمل یا کبودی این ناحیه حتما به پزشک گزارش شود.
- درد در ناحیه معمولا خفیف بوده و بر طرف می شود.
- هر گونه احساس سردی، گزگز و بی حسی در انگشتان پا در سمت محل ورود کنتر اطلاع داده شود.



دانشگاه علوم پزشکی شیراز



مرکز آموزشی درمانی شهید دکتر فقیهی

بالون زدن دریچه میترال

ویژه آموزش به بیمار

تهیه کننده:

راحله مصلی نژاد - کارشناس پرستاری
افسون توفیق - کارشناس ارشد پرستاری

تایید کننده :

دکتر پیمان ایزدپناه

(متخصص قلب و عروق، فلوشیپ اینترروشنال)

پرستاری داخلی جراحی برونر و سودارث ۲۰۱۸

تابستان ۱۴۰۰

EDU-PT-31/B

- قبل از انجام هر اقدامی از قبیل مراجعه به دندانپزشکی و ... پزشک از مصرف این داروها مطلع باشد.
- رژیم غذایی کم نمک باشد.

نکته مهم:

هر گونه خونریزی، تورم، خونمردگی، درد جدید در محل آنژیوگرافی، تب، تغییر رنگ در پوست پا و احساس گزگز و سرما در پای آنژیو شده گزارش شود.

با آرزوی سلامتی

- پانسمان ناحیه، ۲ روز بعد از آنژیو برداشته می شود.
- با اجازه پزشک حمام کرده و تا ترمیم کامل زخم کشاله ران از حمام در وان خودداری شود.
- داروها را طبق نظر پزشک و به موقع و با دقت مصرف شود.
- به عوارض داروهای مصرفی دقت شود و در صورت بروز عوارض به پزشک اطلاع شود.
- داروهای ضد انعقاد مانند وارفارین و... ممکن است شروع شود. این دارو بسیار مهم بوده و باید طبق دستور پزشک مصرف شود. این دارو باعث خونریزی شده و در صورت بروز خونریزی سریعاً به پزشک مراجعه شود.