

اندوسکوپی:

از طریق اندوسکوپی پزشک می تواند مری، معده و دوازدهه (اثنی عشر) شما را به وضوح ببیند.

این تست برای افرادی استفاده می شود که:


- مشکلات گوارشی مانند سوزش سر دل، درد شکم و علائم خونریزی گوارشی دارند انجام می شود.
- تشخیص زخم، پولیپ و توده های دستگاه گوارش فوقانی
- گاهی از این تست در مواردی که غذا یا جسم خارجی در مری گیر کرده باشد استفاده می شود.
- در موارد کنترل خونریزی و برداشتن پولیپ نیز استفاده می شود.

روش انجام اندوسکوپی

روش انجام این فرایند بصورتی است که یک لوله قابل انعطاف (مجهز به منبع نور و گیرنده ویدئویی) را از طریق دهان وارد دستگاه گوارش می کنند. علاوه بر

مشاهده داخلی دستگاه گوارش توسط این روش، امکان نمونه برداری از مخاط نیز وجود دارد.

اندوسکوپی معده و قسمت فوقانی دستگاه گوارش



آمادگی های قبل از اندوسکوپی:

- از ۸ ساعت قبل از خوردن و آشامیدن پرهیز کنید (به استثنا داروهای تجویز شده توسط پزشک).
- در موارد اورژانس محتویات معده توسط دستگاه مکنده (ساکشن) تخلیه خواهد شد.
- در صورت مصرف داروهای ضد انعقادمثل وارفارین، آسپرین و پلاویکس پزشک خود را مطلع نمایید.
- دندان مصنوعی قبل از انجام فرایند از دهان خارج گردد.

- مدارک پزشکی شامل اندوسکوپی های قبلی و جواب آزمایشات خود را همراه داشته باشید.

مراحل حین اندوسکوپی:

- ابتدا شما روی تخت دراز خواهید کشید. در صورتی که نیاز به تزریق داروهای آرامبخش احساس شود، پرستار برای شما یک راه وریدی باز می کند (رگ می گیرد) و آن را به سرم وصل می کند و داروی آرامبخش از طریق سرم به شما تزریق می شود، که البته در غالب مواد اندوسکوپی بدون نیاز به تزریق داروهای آرامبخش انجام می شود.
- در مرحله بعد داروی بی حسی به درون حلق شما اسپری خواهد شد این دارو مزه بدی دارد و ممکن است احساس بی حسی و تورم در حلق داشته باشید.
- مطمئن باشید در حین انجام آزمایش تنفس شما دچار مشکل نخواهد شد.
- با قرار دادن یک محافظ در دهان از دندانهای شما محافظت خواهد شد.



دانشگاه علوم پزشکی شیراز



مرکز آموزشی درمانی شهید دکتر فقیهی

اندوسکوپی

ویژه آموزش به بیمار

تهیه کننده:

مرضیه امیری - کارشناس پرستاری

زهرا فتاحی - کارشناس پرستاری

تایید کننده:

دکتر سمیرا ساعیان

(متخصص داخلی فوق تخصص گوارش)

منبع:


پرستاری داخلی جراحی برونسودارث ۲۰۱۸

تابستان ۱۴۰۰

EDU-PT-19/B

عوارض و خطرات احتمالی:

در موارد بسیار نادری احتمال بروز خونریزی، آسیب به روده، معده و مری وجود دارد.



درمان جایگزین:

در اغلب اوقات سایر تستهای تشخیصی مانند عکسبرداری یا سونوگرافی نمی توانند اطلاعات مشابه اندوسکوپی را در اختیار پزشک و بیمار قرار دهند و جایگزین مناسبی نیستند.

- به هنگام وارد شدن لوله و انجام معاینه در شکم احساس پری خواهید کرد.
- تنفس و فشار خون شما در طی انجام آزمایش تحت نظر خواهد بود.

پس از انجام اندوسکوپی ممکن است:

- احساس تورم در ناحیه حلق و مشکل بلع داشته باشید که در این حالت، گذراست و پس از رفع آن می توانید با مشورت پزشک، غذا مصرف نمایید.
- در صورت استفاده از داروی آرام بخش (میدازولام) حین اندوسکوپی تا ۲۴ ساعت از رانندگی و انجام کارهایی که نیاز به هوشیاری دارند خودداری فرمایید.