



نام ژنریک: ASA (آ اس آ)

نام شیمیایی: استیل سالسیلیک اسید

نام تجاری: آسپرین

آسپرین

۱. به جز مصرف طولانی مدت به منظور جلوگیری از انعقاد خون بدون توصیه پزشک به مدت بیش از ۲ روز مصرف نشود.
۲. از جویدن یا خرد کردن قرصهای پیوسته رهش یا روده ای پرهیز شود.
۳. در صورت بروز وزوز گوش، کاهش شنوایی یا سرگیجه، دارو را قطع و به پزشک مراجعه کنید.
۴. تحریک معدی ممکن است بوسیله تجویز دارو همراه با یک لیوان پر از آب، شیر یا غذا به حداقل برسد.
۵. در صورتیکه دارو دارای بوی سرکه مانند باشد از مصرف آن پرهیز شود.

۶. در صورت بروز درد شدید معده، استفراغ خونی یا قهوه ای رنگ یا وجود خون در ادرار و مدفوع، تورم یا خارش پوست، تورم در صورت و پلک، مشکل در تنفس، گیجی شدید و خواب آلودگی به پزشک اطلاع دهید.

۷. اگر از سایر داروهای ضد انعقاد استفاده می کنید به پزشک اطلاع دهید.

۸. آسپرین ممکن است سبب نتایج نادرست برخی تستهای قند ادرار شود.

۹. دارو در محل خشک و خنک نگهداری شود.

۱۰. از مصرف الکل پرهیز شود.

۱۱. در صورت اعمال دندانپزشکی یا جراحی حتما مصرف آسپرین را اطلاع دهید.

۱۲. در صورت ابتلا به بیماری فاویسم پزشک را مطلع سازید.

واحد آموزش به بیمار

EDU-PT-225/A