



نام ژنریک :استامینوفن

نام تجاری :آپوتل

مکانیسم دارو :مسکن -ضد درد

### استامینوفن

۱. دوز دارو از حد مجاز تجاوز نکند.
۲. جهت تجویز به بچه ها، استفاده بیش از ۵ روز و بیشتر از ۱۱ روز در بزرگسالان و همچنین در صورت بالا ماندن تب به مدت بیشتر از ۳ روز با پزشک مشورت شود.
۳. در صورت مصرف ترکیبات حاوی کدئین از انجام کارهای
۴. مستلزم هوشیاری و همچنین کارهای ماشینی، پرهیز شود.
۵. مصرف مقادیر زیاد و مزمی تواند سبب آسیب کبد و سایر اثرات سمی شود.
۶. از مصرف الکل اجتناب کنید.
۷. این دارو را می توان با معده خالی و یا همراه با غذا مصرف نمود.
۸. دارو همراه با یک لیوان آب مصرف شود.
۹. افراد با تغذیه ضعیف یا مصرف مزمن الکل، حتی با مصرف مقادیر متوسط استامینوفن مستعد مسمومیت کبد هستند.
۱۰. در صورت ابتلا به بیماری فاویسم پزشک را مطلع سازید.

واحد آموزش به بیمار

EDU-PT-219/A