



نام ژنریک: استازولامید
دیاموکس: تجاری نام
مکانیسم دارو: قلیایی کردن ادرار - ادرار آور

استازولامید

۱. می توانید دارو را با غذا یا شکم خال میل نمایید. در صورتی که مشکل گوارشی دارید آن را با غذا میل کنید.

۲. فرم قرص های معمولی را می توان تکه کرد و با آب یا عسل میل نمود این کار طعم تلخ دارو را کاهش می دهد. دارو را با آب میوه ها ان را مخلوط نکنید.

۳. این دارو می تواند باعث افزایش حساسیت شما به تابش آفتاب شود. از قرار گیری در معرض تابش مستقیم آفتاب چراغ های خورشیدی و مصرف مواد برنزه کننده پرهیز کنید. از ضد آفتاب، کلاه و لباس های پوشیده استفاده کنید.

۴. در صورتی که مبتلا به فاویسم هستید، در مصرف دارو احتیاط کنید. این دارو می تواند موجب کم خونی در شما شود. از این رو به پزشک یا دارو ساز خود اطلاع دهید.

۵. این دارو با برخی از دارو های دیگر تداخل و ناسازگاری دارد. اگر دارو های دیگری مصرف می کنید به پزشک یا دارو ساز خود اطلاع دهید.

واحد آموزش به بیمار

EDU-PT-220/A