



نام ژنریک: آلومینیوم ام جی

نام تجاری: مالوکس

مکانیسم دارو: درمان زخم معده، ریفلاکس، زخم دوازده و سوءهاضمه

### آلومینیوم ام جی

۱. دارو طی ۲۰ دقیقه تا یک ساعت بعد از غذا و قبل از خواب مصرف شود.
۲. دارو فقط به مقدار تجویز شده مصرف شود.
۳. قبل از مصرف، سوسپانسیون را خوب تکان داده و قرص ها کاملا جویده شوند و بدنبال آن مقداری آب یا شربت مصرف شود.
۴. احتمال بروز یبوست وجود دارد، میزان مایعات مصرفی خود را زیاد کنید.
۵. در صورت عدم بهبودی، عود عارضه یا علائم خونریزی معده (مدفوع تیره و قیری رنگ، استفراغ حاوی خون تیره و زمینه قهوه ای) به پزشک اطلاع داده شود.
۶. مصرف بیش از ۲ هفته این دارو به طور مداوم باید با نظر پزشک باشد.

واحد آموزش به بیمار

EDU-PT-222/A

یک قاشق غذا خوری معادل ۱۰ سی سی  
یک قاشق مربا خوری معادل ۵ سی سی  
یک قاشق چایخوری معادل ۲/۵ سی سی