



نام ژنریک: آمی تریپتیلین

نام تجاری: الاویل

مکانیسم دارو: ضد افسردگی سه حلقه ای

### آمی تریپتیلین

۱. مشکلات مربوط به خواب و اشتهاى شما ممکن است پس از یک هفته مصرف دارو بهبود یابد، اما برای شروع اثر دارو و بهبود سایر علائم بیماری ممکن است ۴-۶ هفته زمان لازم باشد. در صورتی که پیش از این زمان بهبودی احساس نکردید داروی خود را قطع ننموده و آن را طبق دستور ادامه دهید.

۲. حس تمایل به آسیب رساندن به خود یا دیگران ممکن است تا درمان کامل بیماری برطرف نگردد اما در صورت تصمیم به آسیب رساندن به خود یا دیگران فوراً به پزشک خود اطلاع دهید.

۳. این دارو ممکن است با داروهای دیگر سازگاری نداشته باشد، پیش از شروع هر دارو یا مکمل جدید با پزشک یا دارو ساز خود تماس حاصل نمایید.

۴. این دارو ممکن است باعث خشکی دهان و در نتیجه پوسیدگی دندان ها گردد. به بهداشت دهان خود توجه نمایید. مصرف آب، آدامس و آبنبات بدون شکر به این عارضه کمک می نماید.

۵. در حین مصرف این دارو ممکن است آسان تر از گذشته دچار آفتاب سوختگی گردید حتی الامکان از تابش مستقیم افتاب، اتاقل های برنزه کننده پوست و... دوری کنید و از پوشش محافظ و عینک آفتابی در نور آفتاب استفاده نمایید.

۶. آمی تریپتیلین در این موارد منع مصرف دارد:

- حساسیت شدید به آمی تریپتیلین
- مصرف همزمان دارو هایی مانند فنلزین، ایزوکربوکسازید و ترانیل سیپرو مین، ظرف ۱۴ روز اخیر در صورت مصرف همزمان با این دارو ها فشار خون به صورت خطرناکی افزایش پیدا می کند.
- فاز نقاهت پس از سکته قلبی
- حمله قلبی اخیر
- مصرف همزمان داروی سیزاپراید
- و شیر دهی.

۷. دارو می تواند قبل یا بعد از غذا استفاده شود .

۸. دارو باعث خواب آلودگی می گردد ولی معمولاً چند هفته پس از شروع مصرف دارو به این عارضه تحمل ایجاد می شود. می توان برای کاهش عارضه دارو را هنگام خواب مصرف نمود.

۹. دارو می تواند شکسته، جویده، خرد و یا در مایعات حل گردد.

واحد آموزش به بیمار

EDU-PT-223/A