

نواحی اطلاع داریم. دود سیگار و همچنین مواد شیمیائی موجود در آن به همراه درجه حرارت بالای آن عامل مسبب بسیاری از این ناراحتی‌ها و مشکلات است. خوب است بدانید درجه حرارات تنباکوی مشتعل شده سیگار تا ۹۰۰ درجه سانتیگراد افزایش می‌یابد که این عامل باعث مشکلات زیادی از قبیل پوسیدگی دندانها و مشکلات دهان می‌شود.

### عارض پوستی:

کاهش کیفیت و کمیت زندگی در افراد سیگاری را می‌توان به بهترین نحو با بررسی بیماری‌های پوستی فرد سیگاری درک کرد، چون مصرف سیگار علاوه بر اثرات تهدید کننده بر ارگان‌های داخلی از جمله قلب و ریه، با تاثیر بر پوست منجر به پیری زودرس پوست شده که سبب کاهش کیفیت زندگی می‌شود و این تاثیرات می‌توانند هشداری برای خطرات شدیدتر و تهدید کننده حیات باشد.

طبق تحقیقات بی‌شماری که انجام شده است در صورت ادامه استعمال دخانیات توسط افراد سیگاری، احتمال مبتلا شدن آنها به انواع سرطان‌ها از قبیل زبان، دهان، غدد براز و حلق (۶ تا ۲۷ برابر)، سرطان بینی (۲ مرتبه بیشتر)، گلو (۱۲ مرتبه)، مری (۸ تا ۱۰ برابر)، حنجره (۱۰ تا ۱۸ برابر)، معده (۲ تا ۳ برابر)، کلیه (۵ برابر) وجود دارد.

### برخی از عوارض مصرف سیگار:

#### عارض ریوی:

امروزه مهمترین علت سرفه‌های مزمن و طولانی، مصرف سیگار و دیگر دخانیات است. البته همه می‌دانند که سیگار باعث سرفه می‌شود ولی شاید خیلی‌ها ندانند که سیگار در درازمدت باعث تخریب ریه می‌گردد. این تخریب به حدی پیشرفت می‌کند که فرد برای ادامه زندگی خود، نیازمند پیوند ریه می‌شود و بدون کپسول اکسیژن نمی‌تواند زنده بماند و حتی از کوچک‌ترین فعالیت‌های روزمره نیز عاجز می‌گردد.

#### عارض قلبی و عروقی:

سیگار کشیدن یک عامل مهم برای ایجاد بیماری‌های قلبی عروقی است. در زندگی امروز ضرر مصرف دخانیات به اندازه فشار خون بالا و چربی خون بالا می‌باشد و به همان اندازه تهدید کننده سلامتی است. امروزه از هر سه مورد مرگ‌ومیر در جهان، یک مورد به علت عارضه‌ی قلبی است.

سیگار، اصلی‌ترین عامل ایجاد کننده‌ی این بیماری است. خطر حمله‌ی قلبی در افراد سیگاری زیر ۴۰ سال، ۵ برابر افراد غیرسیگاری است.

#### عارض دهان و دندان:

همگی از مضرات سیگار در بروز ناراحتی‌های ریوی، تنفسی، گوارشی و بروز انواع و اقسام سرطانهای این

طبق تحقیقات سازمان جهانی بهداشت در هر ۸ ثانیه یک نفر در دنیا به علت استعمال دخانیات جان خود را از دست می‌دهد.

نتایج تحقیقات حاکی از آن است چنانچه افراد در سنین نوجوانی شروع به کشیدن سیگار کنند (بیش از ۷۰ درصد موارد سیگاری شدن در این مرحله اتفاق می‌افتد) و مدت ۲۰ سال یا بیشتر به این عمل ادامه بدهند بین ۲۰ تا ۲۵ سال زودتر از افرادی که به هیچ‌وجه در زندگی سیگار نکشیده‌اند، در معرض خطر مرگ و میر قرار خواهند گرف.

تنها سرطان ریه یا بیماری‌های قلبی پیامدهای استعمال دخانیات نیست بلکه مجموعه‌ای از مسایل و مشکلات بهداشتی در ارتباط با مصرف مواد دخانی وجود دارد که می‌تواند به لحاظ شرایط جسمانی و مقاومت ایمنی در افراد سیگاری بروز می‌کند.





دانشگاه علوم پزشکی شیراز



مرکز آموزشی درمانی شیبد دکتر فقیهی شیراز

## مضرات استعمال دخانیات

ویژه آموزش به بیمار

### تهیه کننده:

افسون توفیق - کارشناس ارشد پرستاری

### تایید کنند: ۵

دکتر رامین رادمهر - پزشک عمومی

### منابع:

ترک سیگار و درمان جایگزین نیکوتین، واحد دخانیات

مرکز پژوهشی سل و بیماریهای ریوی تهران

دکتر محمد رضا مسجدی ۱۴۰۰

تابستان ۱۴۰۰


EDU-PT-137/B

مایعات زیادی بنوشید، کار سرگرم کننده ای برای هر روز خود تدارک ببینید و در آغاز ترک، برنامه معمول خود را تغییر دهید.

- دقت داشته باشید تا حدود سه ماه پس از ترک احتمال بازگشت وجود دارد به خصوص زمانی که اتفاقات غیرمنتظره و تنش زا به وقوع می پیوندد.

جعبه ای برای ذخیره مالی حاصل از نخریدن سیگار تهیه کنید.

در جستجوی کمک، حمایت و تشویق باشید و از مشاوران متخصص در زمینه ترک سیگار کمک بگیرید. به خانواده، دوستان و همکارانتان بگویید که در حال ترک سیگارید و از آنها درخواست حمایت کنید و از آنها بخواهید جلوی سیگار نکشند.



### گام های اولیه برای ترک سیگار :

به شکل قاطع و مثبت تصمیم بگیرید که می خواهید سیگار را ترک کنید.

مقدار زیادی مایعات بنوشید تا نیکوتین را از سیستم بدن خود خارج کنید.

با رفتن به مکان هایی که سیگار کشیدن منع است تحمل خود را در نکشیدن سیگار بالا ببرید.

در محل زندگی یا کار خود جانشین هایی برای سیگار قرار دهید. مثلاً تنقلاتی نظیر آجیل، آبنبات و... در اختیار داشته باشید . در طول روز تعداد سیگارهای خود را کاهش دهید. تنها نیمی از هر عدد سیگار را بکشید.

کشیدن اولین سیگار خود را یک ساعت به تاخیر بیاندازید.

زیرسیگاری خود را تمیز نکنید

زمانی که میل شدید برای مصرف دارید حواس خود را پرت کنید، آب و