

داروی آکسابین axabin چیست؟

آکسابین یا ریواروکسaban، یک داروی ضد انعقاد

نسل جدید است که جهت درمان و پیشگیری از اختلالات انعقادی که منجر به ایجاد لخته خون در رگ های بدن می شوند، استفاده می شود. این دارو جایگزین پلاویکس نبوده و بعنوان یک داروی جدید می باشد.

موارد مصرف ریواروکسaban

- پیشگیری از حوادث ترومبولیتیک بعد از جراحی های لگن و زانو
- پیشگیری از سکنه مغزی و آمبولی سیستمیک در بیماران مبتلا به فیبریلاسیون دهلیزی غیر دریچه ای
- درمان DVT و آمبولی ریه

مکانیسم اثر ریواروکسaban

این دارو باعث مهار فعالیت پلاکت و تشکیل لخته فیبرینی از طریق مهار مستقیم، انتخابی و برگشت پذیر فاکتور Xa در هر دو مسیر انعقادی داخلی و خارجی می شود.

مزایای داروی آکسابین

- خوراکی بودن دارو

- مصرف تنها یک بار در روز
- عدم نیاز به آزمایشات مکرر انعقادی
- تداخلات کمتر دارو با غذاها و داروها

موارد احتیاط

- ریواروکسaban در حاملگی و شیردهی قابل استفاده نیست. همچنین در بیمارانی که نارسائی شدید کلیه دارند، مصرف این دارو توصیه نمی شود.
- در بیماران مبتلا به اختلال متوسط تا شدید کبدی این دارو نباید مصرف شود.
- در بیماران مبتلا به اختلال متوسط کلیوی با احتیاط مصرف شود.

موارد منع مصرف

- حساسیت شدید به دارو یا سایر ترکیبات فرمولاسیون
- خونریزی فعال ناشی از بیماری
- سن کمتر از ۱۸ سال
- در دوران بارداری و شیردهی
- در صورت نارسایی کبد متوسط تا شدید

تداخلات دارویی ریواروکسaban

- مصرف همزمان این دارو با داروهای زیر می تواند خطرناک باشد :
کتوکونازول، ایتراکونازول، وریکونازول، ریتوناویر، فنی توئین، کاربامازپین، ریفامپین اجتناب شود.
- همین طور مصرف توأم ریواروکسaban با سایر داروهایی که ریسک خونریزی را افزایش می دهند(نظیر آنتی پلاکت ها) ریسک خونریزی را بیشتر می کند. بنابراین باید در انتخاب بیمارانی که به طور همزمان نیاز به آنتی پلاکت و آنتی کوآگولانت (ریواروکسaban، وارفارین و...) دارند، دقت شود.
- مصرف توأم مهار کننده های ضد التهاب با (NSAIDs) غیر استروئیدی ریواروکسaban، باعث افزایش ریسک خونریزی شده و بهتر است اجتناب شود.



دانشگاه علوم پزشکی شیراز



مرکز آموزشی درمانی شهید دکتر فقیهی

داروی آکسابین (Axabin) یا

ریواروکسابان (Rivaroxaban)

ویژه آموزش به بیمار

تهیه کننده:

مرضیه امیری - کارشناس پرستاری

افسون توفیق - کارشناس ارشد پرستاری

نایب کنند ه:

دکتر بهرام قاسم زاده - فوق تخصص جراحی

قلب

منابع:

<http://www.fierecbiotech.com/press-releases/bayers-xarelto-approved-canada>

تابستان ۱۴۰۰

EDU-PT-226/A

- در دمای اتاق، بین ۲۰ تا ۲۵ درجه سانتیگراد
- دور از دسترس اطفال

عوارض جانبی ریواروکسابان

- قلبی عروقی: ادم محیطی
 - سیستم عصبی مرکزی: سردرد، گیجی، تب
 - پوستی: کبودی، خارش، راش
 - گوارشی: یبوست، اسهال، درد شکمی، تهوع
 - تناسلی ادراری: وجود خون در ادرار
 - خونی: خونریزی، ترومبوسیتوپنی، هماتوم، آنمی
 - کبدی: افزایش آنزیمهای کبدی و بیلی روبین
 - موضعی: ترشح از زخم
 - عصبی عضلانی و اسکلتی: درد اندام ها، اسپاسم عضلانی
 - تنفسی: خون دماغ شدن، خلط خونین
- طول درمان با آکسابین
- طول درمان با دارو بسته به نظر پزشک معالج و با توجه به ارزیابی نوع بیماری و شرایط جسمانی بیمار تعیین می گردد.
- شرایط نگهداری دارو