



نام ژنریک: آزاتیوپرین

نام تجاری: ایموران

مکانیسم دارو: سرکوب کننده سیستم ایمنی و برای پیشگیری از

رد عضو پیوند شده

آزاتیوپرین

۱. این دارو ممکن است با داروهای دیگر سازگاری نداشته باشد، پیش از شروع هر دارو یا مکمل جدید با پزشک یا دارو ساز خود تماس حاصل نمایید.

۲. دارو را می توانید با یا بدون غذا مصرف کنید.

۳. در صورت بروز تهوع و استفراغ، وعده های غذایی سبک، مصرف آدامس های بدون شکر می تواند این عارضه را کاهش دهد.

۴. علایمی مانند مدفوع کم رنگ، ادرار تیره، زردی و خارش را سریعاً گزارش دهید.

۵. در صورت بروز علائم عفونت مانند تب بالای ۴۰ درجه سانتی گراد، لرز و گلو درد شدید، سرفه، افزایش خلط و یا تغییر رنگ آن، زخم دهان، خارش ناحیه مقعد، درد یا سوزش هنگام ادرار کردن، به پزشک مراجعه کنید.

۶. در طول مصرف این دارو تست های خونی باید به صورت منظم و طبق دستور پزشک انجام شوند.

۷. در طول مصرف این دارو از روش مطمئنی برای جلوگیری از بارداری استفاده کنید این دارو نباید در بارداری مصرف شود.

واحد آموزش به بیمار

EDU-PT-194/A