



نام ژنریک: بکلومتازون

نام تجاری: بکلکس

مکانیسم دارو: اسپری ضد التهاب

بکلومتازون

1. دارو علائم تسکینی فوری ایجاد نمی کند.
2. قبل از مصرف دارو آن را تکان دهید.
3. افشانه دهانی یا بینی را در فواصل منظم و طبق دستور پزشک مصرف شود.
4. در صورت بدتر شدن نشانه ها یا عدم بهبودی در مدت 2 یا 3 هفته به پزشک اطلاع دهید.
5. افشانه دهانی یا بینی را دور از شعله یا حرارت نگه دارید.
6. افشانه را سوراخ نکرده و درون آتش نیاندازید.
7. جهت پیشگیری از خشکی دهان و حلق، بعد از استفاده از دارو دهان خود را با آب بشویید.
8. در صورت بروز زخم در گلو یا دهان به پزشک اطلاع دهید.
9. قبل از تزریق واکسن آنفولانزا و یا واکسن دیگری با پزشک مشورت شود.
10. در کودکان کمتر از 8 سال از وسایل حجم دهنده مانند آسم یار، دم یار و آسان نفس استفاده شود.

۱۱. در صورت حساسیت به دارو مانند تنگی نفس شدید، آبی
رنگ شدن پوست، گیجی و خواب آلودگی شدید و خارش
به پزشک اطلاع دهید.

واحد آموزش به بیمار

EDU-PT-195/A