



نام ژنریک: بتامتازون

نام تجاری: بتادرم

مکانیسم دارو: ضد التهاب

بتامتازون

۱. در صورت عدم بهبود علایم و نشانه های بیماری، تورم شدید زبان صورت لب ها، تنگی نفس شدید، آبی شدن رنگ پوست، گیجی و خواب آلودگی شدید به پزشک یا دارو ساز خود اطلاع دهید.

۲. در صورت خارش و تحریک شدید موضعی، علایمی که نشان دهنده عفونت باشد، در صورت بروز علایم قطع دارو مانند احساس خستگی شدید، ضعف، احساس بی قراری، تپش قلب پزشک یا دارو ساز خود را مطلع سازید.

۳. در اطفال کمتر از ۱۲ سال، دارو بدون نظر پزشک متخصص استفاده نشود.

۴. بهتر است منطقه مورد نظر را قبل از استعمال دارو تمیز کنید. در صورت شستشو بهتر است بعد از خشک شدن کامل از دارو استفاده نمایید.

۵. بهتر است دارو در اطراف چشم ، در صورت ، مقعد کشاله ران و ناحیه تناسلی استفاده نشود مگر در موارد خاص و با دستور پزشک باشد .

۶. بهتر است بعد از استعمال دارو سطح مورد نظر را با باند یا هر نوع پوشش دیگر نپوشانید مگر دستور پزشک معالج باشد .

۷. از تماس با دهان ، بینی و چشم خودداری کنید.

۸. برای جلوگیری از ناراحتی گوارشی دارو را با غذا مصرف کنید .

۹. در صورتی که مبتلا به عفونت های قارچی هستید، از مصرف دارو خودداری کنید.

۱۰. تا دو ساعت قبل و بعد از مصرف این دارو ، از ترکیبات آنتی اسید استفاده نکنید .

۱۱. در صورت احساس تنگی نفس یا سنگینی در قفسه سینه ، تب ، لرز، گلو درد شدید، درد گوش یا سینوس ، سرفه های شدید ، افزایش خلط یا تغییر رنگ آن ، زخم های دهانی ، احساس خستگی شدید، ضعف، لرزش، تندی ضربان قلب ، گیجی ، تهوع یا استفراغ شدید ، افزایش وزن شدید ، تغییر ناگهانی بینایی، ایجاد هرگونه جوش در سطح پوست با پزشک تماس بگیرید.

واحد آموزش به بیمار

EDU-PT-228/A