

جدول معیارهای تشخیصی بالینی تب خونریزی دهنده کریمه کنگو (CCHF)

بیش از یک هفته یا نامشخص	کمتر از یک هفته	*سابقه تماس با عفونت*
۲	۳	گزش کنه یا له کردن با دست بدون پوشش (بدون دستکش یا حفاظ)
۲	۳	تمکاس مستقیم با خون تازه یا سایر بافتهای دام یا حیوانات بیمار
۲	۳	تماس مستقیم با خون، ترشحات با مواد دفعی بیمار تأیید شده یا مشکوک به CCHF
۱	۲	اقامت یا مسافرت در یک محیط روستایی که احتمال تماس با دامها یا کنه وجود داشته باشد
نشانه ها و علائم		
	۱	شروع ناگهانی
	۱	تب بیش از ۳۸ درجه برای یکبار
	۱	سر درد شدید
	۱	درد عضلانی
	۱	حالت تهوع یا بدون استفراغ
	۱	تمایا به خونریزی، راش، پتشی، اکیموز، خونریزی از بینی
	۳	استفراغ خونی،هماچوری یا ملنا
یافته های آزمایشگاهی طی ۵ روز اول بیماری		
	۱	لکوپنی کمتر از ۳۰۰۰ در میلی متر مکعب یا لکوسیتوز بیش از ۹۰۰۰ در میلی متر مکعب
	۱	ترومبوسیتوپنی (پلاکت کمتر از ۱۵۰۰۰۰ در میلی متر مکعب) پلاکت کمتر از ۱۰۰۰۰۰ در میلی متر مکعب یا کاهش ۵۰٪ گلبولهای سفید یا پلاکتها طی ۳ روز
	۲	PT غیر طبیعی
	۱	PTT غیر طبیعی
	۱	افزایش ترانس آمینازها
	۱	AST بیشتر از ۱۰۰ واحد در لیتر
	۱	ALT بیشتر از ۱۰۰ واحد در لیتر

چنانچه جمع امتیازات ۱۲ یا بیشتر شود مورد بعنوان مورد محتمل CCHF تلقی شده و تحت درمان قرار می گیرد.

واحد کنترل عفونت بیمارستان فقیهی