

"دستورالعمل پروفیلاکسی استفاده از داروهای ضد ویروسی HIV در پرسنل مواجهه دیده با بیماران HIV مثبت"

احتراما با توجه به مصوبه کمیته کنترل عفونت و تأیید پزشک کمیته کنترل عفونت (استاد داور پناه) و هماهنگی با دکتر شکیبیا پزشک مرکز لاوان و با توجه به اینکه روند شروع داروی پروفیلاکسی مرکز لاوان تغییر یافته، از تاریخ ۹۶/۱۲/۲۶ طب پروتکل زیر پروفیلاکسی برای پرسنلی که با بیماران مشکوک به HIV مواجهه داشته اند انجام می شود.

۱- اگر بیمار ۱۰۰٪ HIV مثبت باشد:

✓ **تراوادا** : روزی ۱ عدد

✓ **کلترا** : روزی ۴ عدد (۲ عدد صبح - ۲ عدد شب)

۲- اگر بیمار مشکوک به HIV بود و جواب وایرال مارکر بیمار آماده نبود :

✓ ۱ عدد **تراوادا** داده شود تا جواب وایرال بیمار آماده شود.

✓ اگر جواب مثبت شد به مرکز لاوان ارجاع داده شود و اگر جواب منفی بود دارو قطع شود.

۳- در صورتیکه داروی "تراوادا" در دسترس نبود و یا پرسنل به این دارو حساسیت داد از داروی "گوباویر" استفاده شود که داروی "گوباویر" روزی ۲ عدد (یکی صبح - یکی شب) استفاده شود.

*در تعطیلات نوروز در صورت داشتن سوال در این خصوص می توانید با موبایل دکتر شکیبیا تماس بگیرید.

*موبایل دکتر شکیبیا: ۰۹۱۷۱۳۸۲۰۹۰

بخشنده

سوپروایزر کنترل عفونت بیمارستان شهید فقیهی