



نام ژنریک: کلیدینیوم سی

نام تجاری: لیبراکس

مکانیسم دارو: درمان مشکلات معده

کلیدینیوم سی

۱. در صورت عدم بهبود علائم و نشانه های بیماری، تورم شدید زبان صورت لب ها تنگی نفس شدید آبی شدن رنگ پوست و گیجی و خواب آلودگی به پزشک یا دارو ساز خویش اطلاع دهید.
۲. دارو ممکن است باعث خشکی دهان شود بهتر است برای درمان و پیشگیری از این مشکل آدامس بدون قند بجوید آب نبات بدون قند مصرف نمایید و به بهداشت دهان و دندان توجه نمایید.
۳. این دارو ممکن است باعث خواب آلودگی شود لذا از رانندگی یا کارهایی که نیاز به هوشیاری دارند مانند کار با ماشین آلات خطرناک خودداری کنید.
۴. در صورت بروز اختلال در دفع ادرار، یبوست شدید، احساس افسردگی و خستگی مفرط یا افکار آسیب زدن به خود و تغییر شدید و توانایی اندیشیدن و هوشیاری به پزشک یا دارو ساز خویش اطلاع دهید.
۵. غذا بر جذب و اثر دارو تاثیری ندارد اما در صورتیکه به منظور درمان سندروم روده تحریک پذیر از دارو استفاده می کنید بهتر است ۳۰ الی ۶۰ دقیقه قبل از غذا باشد.

۶. بمنظور کاهش عارضه یبوست ناشی از این دارو را همراه با آب فراوان استفاده نمایید، بخصوص در هوای گرم برای پیشگیری از کمبود آب بدن آب و مایعات فراوان بنوشید .

واحد آموزش به بیمار

EDU-PT-234/A