



نام ژنریک: دگزامتا زون

نام تجاری: دکادرون - دکادروول

مکانیسم دارو: ضد التهاب

دگزا متازون

۱. در صورت عدم بهبود علائم و نشانه های بیماری، تورم شدید زبان، صورت لب ها، تنگی نفس شدید، آبی شدن رنگ پوست، گیجی و خواب آلودگی شدید به پزشک یا دارو ساز خود اطلاع دهید.
۲. در صورت خارش و تحریک شدید موضعی، علائمی که نشان دهنده عفونت باشد، در صورت بروز علائم قطع دارو مانند احساس خستگی شدید، ضعف، احساس بی قراری، تپش قلب پزشک یا دارو ساز خود را مطلع سازید.
۳. بهتر است برای کاهش عوارض گوارشی دارو همراه غذا استفاده شود. بهترین زمان مصرف دارو در صورتی که روزی یک بار باشد صبح ها همراه صبحانه است و در مصرف همزمان با دارو های آنتی اسید خودداری کنید و حداقل با فاصله استفاده نمایید.
۴. در صورتی که دارو را بیش از چند هفته استفاده می کنید قبل از قطع دارو حتما باید با پزشک مشورت نمایید زیرا دارو باید به آرامی قطع شود.

۵. اگر مبتلا به موارد زیر هستید به پزشک تجویز کننده دارو اطلاع دهید :گلوکوم (آب سیاه)، پر فشاری خون، بیماری عفونی، یوکی استخوان، زخم گوارشی (زخم معده یا اثنی عشر)، سل، نارسایی قلبی و دیابت.
۶. در صورت مصرف موضعی، بهتر است محل مورد نظر را قبل از استعمال دارو تمیز شود . در صورت شستشو بهتر است بعد از خشک شدن کامل از دارو استفاده نمایید.
۷. بهتر است دارو در اطراف چشم، در صورت، مقعد، کشاله ران و ناحیه تناسلی استفاده نشود مگر در موارد خاص و با دستور پزشک.
۸. بهتر است بعد از استعمال دارو سطح مورد نظر را با باند یا هر پوشش دیگر نپوشانید، مگر دستور پزشک معالج باشد.

واحد آموزش به بیمار

EDU-PT-205/A