



نام ژنریک: دکسترومتورفان
نام تجاری: بنیلین
مکانیسم دارو: ضد سرفه

دکسترومتورفان

۱. در صورت عدم بهبود علائم و نشانه های بیماری، تورم شدید زبان صورت لب ها، تنگی نفس شدید، آبی شدن رنگ پوست، گیجی و خواب آلودگی شدید به پزشک یا دارو ساز خود اطلاع دهید.
۲. در صورت سرفه ادامه دار، خارش و تحریک شدید موضعی پزشک یا دارو ساز خود را مطلع سازید.
۳. در اطفال کمتر از ۴ سال از دارو بدون نظر پزشک استفاده ننمایید.
۴. این دارو ممکن است باعث خواب آلودگی شود لذا از رانندگی یا کارهایی که نیاز به هوشیاری دارند مانند کار با ماشین آلات خطرناک خودداری کنید.
۵. این دارو در بسیاری از دارو هایی که برای درمان سرما خوردگی استفاده می شود، وجود دارد بنابراین در صورت مصرف هر داروی سرما خوردگی با پزشک یا داروساز خویش مشورت نمایید.
۶. این دارو در درمان سرفه ناشی از سرطان ریه، ناشی از سیگار سرفه مزمن و نارسایی مزمن ریه استفاده نمی شود و بهتر است در موارد فوق حتما با مشورت پزشک استفاده شود.

واحد آموزش به بیمار

EDU-PT-238/A