



نام ژنریک :دیجوکسین

نام تجاری :لانوکسین

مکانیسم دارو :افزایش دهنده قدرت انقباضی قلب - کاهش ضربان قلب

دیجوکسین

۱. این دارو طبق دستور پزشک مصرف شود.
۲. قبل از مصرف دارو نبض خود را در ۱ دقیقه بشمارید. در صورت کمتر از ۶۰ ضربه در دقیقه یا بیش از ۱۱۰ ضربه در دقیقه به پزشک خود اطلاع دهید.
۳. مقدار دارو ۲ برابر یا حذف نگردد.
۴. در یک زمان در طول روز مصرف شود.
۵. در صورت مصرف داروی دیگری آن را به پزشک خود اطلاع دهید.
۶. در صورت مراجعه به دندانپزشک یا قبل از انجام جراحی پزشک معالج را در جریان بگذارید.
۷. در صورت داشتن علائم زیر به پزشک خود اطلاع دهید، بی اشتهایی، تهوع، استفراغ، اسهال، درد

- شکم، ضربان قلب نامنظم، غش، تنگی نفس،
خارش، کاهش قدرت بینایی، اختلال در هوشیاری
و دیدن هاله آبی در اطراف اشیا
۸. بهتر است دارو با معده خالی مصرف شود، اما در
صورت عوارض گوارشی می توان همراه غذا یا شیر
مصرف نمود.
۹. بهتر است از یک نمونه دارو استفاده شود.
۱۰. غذاهای سرشار از پتاسیم مثل موز، زردآلو پرتقال،
کیوی و سیب زمینی مصرف نمایند.
۱۱. این دارو همزمان با داروهای ضد اسید معده مصرف
نشود.
۱۲. از قطع ناگهانی دارو پرهیزید.

واحد آموزش به بیمار

EDU-PT-207/A