



نام ژنریک :دیفن هیدرامین
نام تجاری :بنادریل
مکانیسم دارو :آنتی هیستامین -ضد سرفه

دیفن هیدرامین

۱. در صورت عدم بهبود علایم و نشانه های بیماری ، تورم شدید زبان صورت لب ها تنگی نفس شدید ابی شدن رنگ پوست و گیجی و خواب اودگی به پزشک یا دارو ساز خویش اطلاع دهید.

۲. در صورت احتباس ادرار و خارش و تحریک شدید موضعی به پزشک یا دارو ساز خود اطلاع دهید.

۳. در اطفال کم تر از دو سال از دارو بدون نظر پزشک استفاده ننمایید .

۴. در پیش گیری از بیماری مسافرت دارو باید یک ساعت قبل از سفر استفاده شود و در صورت طولانی بودن سفر هر ۶ ساعت تکرار شود.

۵. این دارو ممکن است باعث گیجی و خواب‌الودگی شود لذا از رانندگی یا کارهایی که نیاز به هوشیاری دارند مانند کار با ماشین الات خطرناک خودداری کنید.

۶. این دارو در بسیاری از دارو هایی که برای درمان سرما خوردگی مانند کلدستاپ و ضد سرفه (دیفن هیدرامین کمپاند) وجود دارد بنابراین در صورت مصرف هر داروی سرما خوردگی با پزشک یا داروساز خویش مشورت نمایید.

۷. در صورت بروز یبوست از مایعات بیشتر و مواد غذایی حاوی فیبر مانند سبزیجات استفاده نمایید در صورت عدم رفع مشکل با پزشک یا دارو ساز در خصوص دارو های ملین مشورت نمایید.

۸. دارو ممکن است باعث خشکی دهان شود بهتر است برای درمان و پیشگیری از این مشکل ادامس بدون قند بجوید اینبات بدون قند بمکید و بیشتر به بهداشت دهان و دندان توجه نمایید.

واحد آموزش به بیمار

EDU-PT-208/A