



نام ژنریک: دیازپام

نام تجاری: والیوم

مکانیسم دارو: شل کننده عضلات و خواب آور

دیازپام

۱. از مصرف طولانی مدت این دارو بدون تجویز پزشک خودداری نمایید زیرا این دارو می تواند باعث ایجاد وابستگی در شما گردد.
۲. هیچ گاه مصرف دارو را به یک باره قطع نکنید بلکه طبق دستور پزشک و به آهستگی دارو را کم کنید و سپس قطع نمایید تا عوارض قطع دارو و بازگشت علائم بیماری اتفاق نیفتد.
۳. دیازپام در این موارد منع مصرف دارد: حساسیت شدید به دارو، بارداری، قصد باردار شدن، شیر دهی، آب سیاه، بیماری کبدی شدید.
۴. دارو می تواند قبل یا بعد از غذا استفاده شود.
۵. دارو باعث خواب آلودگی می گردد.
۶. دارو می تواند شکسته، خرد، جویده و یا در مایعات حل شود.
۷. مصرف این دارو در افراد بالای ۶۵ سال باید با احتیاط صورت گیرد.
۸. دیازپام تزریقی نباید با داروی دیگری در سرنگ مخلوط کرد.
۹. از مصرف همزمان فراورده های حاوی الکل با این دارو خودداری شود.

واحد آموزش به بیمار

EDU-PT-206/A