



نام ژنریک: اریترومايسين

نام تجاری: اريتروسين

مکانيسم دارو: آنتی بیوتیک

### اریترومايسين

۱. دارو را بیش از مقدار و مدت توصیه شده توسط پزشک، مصرف نکنید و علی رغم احساس بهبودی دوره درمان را کامل نمایید.

۲. در صورت بروز اسهال، فوراً به پزشک یا داروساز اطلاع دهید.

۳. حین مصرف دارو، فشار خون خود را به طور منظم کنترل کنید.

۴. برای جذب بیشتر دارو، آن را با یک لیوان پر از آب، یک ساعت قبل، یا یک تا دو ساعت بعد غذا میل کنید.

۵. از مصرف دارو همراه با گریپ فروت یا آب آن خودداری کنید.

۶. قبل از استعمال محلول موضعی اریترومايسين، ابتدا موضع را با آب و صابون شسته و خشک کنید. از به کار بردن این محلول

در نواحی نزدیک چشم، بینی، دهان یا سایر مخاط ها خودداری کنید.

۷. قبل و بعد از استعمال شکل چشمی دارو، دست ها را بشوید و نواحی اطراف چشم را قبل از مصرف دارو تمیز کنید.

۸. از تماس لوله پماد با داخل چشم و یا اطراف آن خودداری کنید.

۹. در صورت بروز هر گونه حساسیت بدنبال مصرف شکل چشمی دارو، مانند خارش پلک ها و سوزش چشم ها به پزشک یا دارو ساز خود اطلاع دهید.

۱۰. ممکن است بعد از مصرف شکل چشمی دارو، تاری دید بروز کند.

۱۱. سوسپانسیون دارو بعد از تهیه در دمای یخچال به مدت ۱۰ روز قابل نگهداری است.

۱۲. سوسپانسیون را قبل از مصرف، به خوبی تکان دهید.

واحد آموزش به بیمار

EDU-PT-209/A