



نام ژنریک : اتامبوتول  
نام تجاری : میامبوتول  
مکانیسم دارو : آنتی بیوتیک

### اتامبوتول

۱. دارو را به مقدار ومدت توصیه شده توسط پزشک مصرف کنید و رژیم درمانی خود و دوره طولانی درمان را کامل نمایید.
  ۲. در حین درمان با این دارو آزمایش های دوره ای خود را طبق دستور پزشک انجام دهید .
  ۳. در صورت بروز هر گونه علایمی از قبیل تاری دید، تغییر در دید رنگ ها کاهش میدان دید و یا هرگونه علامت دیگر چشمی به پزشک معالج خود اطلاع دهید.
  ۴. بهتر است دارو را با شکم خالی میل نمایید ولی در صورت احساس ناراحتی در مصرف دارو با شکم خالی، همراه غذا میل شود.
  ۵. برای کسب بهترین پاسخ، سعی کنید هیچ دوزی را فراموش نکنید .
  ۶. علی رغم احساس بهبودی دوره ی درمان را کامل کنید .
  ۷. این دارو را با فاصله ی ۲ساعت با آنتی اسید های حاوی آلومینیوم مصرف نمایید.
- واحد آموزش به بیمار

**EDU-PT-241/A**