



نام ژنریک: فاموتیدین

نام تجاری: پیسید

مکانیسم دارو: درمان مشکلات گوارشی

### فاموتیدین

۱. در صورتی که از دارو به عنوان درمان زخم گوارشی استفاده می کنید دوره درمان را کامل کنید و حتی در صورت بهبودی دارو را تا پایان دوره قطع نکنید.

۲. در صورتی که روزی یک بار از دارو استفاده می کنید، بهتر است شب هنگام خواب دارو را میل نمایید.

۳. در صورت عدم بهبود علائم و نشانه های بیماری، تورم شدید زبان صورت لبها، تنگی نفس شدید، آبی شدن رنگ پوست و گیجی و خواب آلودگی شدید به پزشک یا دارو ساز خویش اطلاع دهید.

۴. به عنوان درمان بدون نسخه از دارو بیش از دو هفته استفاده نکنید مگر تشخیص پزشک معالج باشد.

۵. این دارو در حالت بدون نسخه نباید در افرادی که دارای مشکلات زیر می باشند استفاده شود و قبل از مصرف می بایست تحت بررسی پزشک قرار گیرند: بلع دردناک، استفراغ خونی، مدفوع خونی، یا سیاه رنگ، درد شکمی که به دست یا شانه تیر می کشد، کاهش وزن نا خواسته و دردی که بیش از سه ماه است ادامه دارد.

واحد آموزش به بیمار

EDU-PT-210/A