



نام ژنریک: هپارین  
نام تجاری: لیکوامن سدیم  
مکانیسم دارو: ضد انعقاد

## هپارین

۱. دارو به صورت وریدی و زیر جلدی تزریق می شود.
۲. محل تزریق را به صورت مرتب تغییر دهید.
۳. به جراح یا دندانپزشک اطلاع دهید که این دارو را مصرف می کنید.
۴. به جهت اینکه به سادگی دچار خونریزی می شوید مراقب ضربه ها به بدن، مسواک زدن و ریش تراش باشید.
۵. کلیه دارو های مصرفی را از لحاظ وجود تداخل با پزشک یا داروساز چک کنید.
۶. در صورت مصرف آسپرین، ویتامین E (ای)، جینسینگ، سیر، بروفن و ترکیبات ضد درد دیگر به پزشک یا دارو ساز اطلاع دهید.
۷. در صورتی که در دوران شیر دهی هستید به پزشک یا دارو ساز اطلاع دهید.
۸. در صورتیکه باردار هستید یا ممکن است باردار باشید به پزشک یا دارو ساز اطلاع دهید.
۹. در صورت افتادن یا تصادف به ویژه ضربه به سر، سردرد، تورم دست و پا، خونریزی های غیر معمول و خستگی شدید یا ضعف، با پزشک تماس بگیرید.

واحد آموزش به بیمار

EDU-PT-213/A