



نام ژنریک: هیدروکسی کلروکین

نام تجاری: پلاکونیل

مکانیسم دارو: درمان و پیشگیری از مالاریا و درمان در بیماریهای خود ایمنی

هیدروکسی کلروکین

۱. دارو را بیش از مقدار و مدت توصیه شده توسط پزشک مصرف ننمایید و علی رغم احساس بهبودی دوره درمان را کامل نمایید.
۲. از قرار گرفتن در معرض نور خورشید حین درمان با این دارو خودداری کنید.
۳. در صورت ایجاد اختلال بینایی، افزایش حساسیت به نور، کاهش شنوایی، اختلالات گوارشی یا ضعف عضلانی به پزشک یا داروساز خود اطلاع دهید.
۴. جهت کاهش عوارض جانبی دارو را بلافاصله قبل یا بعد از غذا و در یک روز مشخص هفته مصرف نمایید.
۵. معاینات چشم پزشکی را به طور منظم و طبق توصیه پزشک انجام دهید.
۶. به دلیل وجود تداخل دارویی، همراه با آنتی اسیدهای حاوی آلومینیوم یا منیزیم مصرف نشود و بین مصرف آنها ۲ ساعت فاصله باشد.

واحد آموزش به بیمار

EDU-PT-244/A