



نام ژنریک: ایزونیازید
نام تجاری: ریمیفون
مکانیسم دارو: آنتی بیوتیک

ایزو نیازید

۱. دارو را به مقدار و مدت توصیه شده توسط پزشک مصرف کنید و رژیم درمانی خود و دوره درمان را کامل کنید.
۲. در حین درمان با این دارو، آزمایش های دوره ای خود را طبق دستور پزشک انجام دهید.
۳. در حین درمان با این دارو از مصرف نوشیدنی های الکلی خودداری کنید.
۴. در صورت بروز هر گونه علائمی از قبیل خستگی، ضعف، تهوع، استفراغ، تیره شدن رنگ ادرار یا زرد شدن چشم ها و یا بروز سوزش یا بی حسی در اندام ها به پزشک معالج خود اطلاع دهید.
۵. بهتر است دارو را با شکم خالی حداقل یک ساعت قبل یا دو ساعت بعد از غذا میل نمایید ولی در صورت احساس ناراحتی در مصرف دارو با شکم خالی، همرا غذا میل شود.

۶. برای کسب بهترین پاسخ سعی کنید هیچ دوزی را فراموش نکنید.

۷. علی رغم احساس بهبودی دوره درمان را کامل کنید.

۸. این دارو را با فاصله یک ساعت با آنتی اسید های حاوی آلومینیوم مصرف نمایید.

۹. در حین درمان با این دارو تا حداقل پس از خاتمه درمان، از مصرف غذا های حاوی تیرامین پرهیز نمایید.

واحد آموزش به بیمار

EDU-PT-216/A