



نام ژنریک: کتوتیفن

نام تجاری: زادیتن

مکانیسم دارو: ضد حساسیت-آنتی هیستامین

کتوتیفن

۱. در صورت عدم بهبود علائم و نشانه های بیماری، تورم شدید زبان صورت لبها، تنگی نفس شدید، آبی شدن رنگ پوست و گیجی و خواب آلودگی شدید به پزشک یا دارو ساز خویش اطلاع دهید.

۲. در اطفال کم تر از ۶ماه از دارو بدون نظر پزشک استفاده ننمایید.

۳. این دارو ممکن است باعث خواب آلودگی شود لذا از رانندگی یا کارهایی که نیاز به هوشیاری دارند مانند کار با ماشین آلات خطرناک خودداری کنید.

۴. در صورت بروز یبوست از مایعات بیشتر و مواد غذایی حاوی فیبر مانند سبزیجات استفاده نمایید در صورت عدم رفع مشکل با پزشک یا دارو ساز در خصوص دارو های ملین مشورت نمایید.

۵. دارو ممکن است باعث خشکی دهان شود بهتر است برای درمان و پیشگیری از این مشکل آدامس بدون قند بجوید آبنبات بدون قند مصرف نمایید و به بهداشت دهان و دندان توجه نمایید.

۶. در صورت عدم تعادل و کاهش توانایی ذهنی، احتیاس ادرار گیجی و خواب آلودگی شدید، خارش و تحریک شدید موضعی به پزشک یا دارو ساز خود اطلاع دهید.

واحد آموزش به بیمار

EDU-PT-217/A