



نام ژنریک: متی ما زول
نام تجاری: تاپازول
مکانیسم دارو: درمان پرکاری غده تیروئید

متی مازول

۱. دارو را در هر زمان از روز به صورت ثابت با شکم خالی یا با غذا مصرف کنید.
۲. در صورتی که شمارش سلول های سفید، قرمز یا پلاکت خون شما پایین باشد، پزشک یا دارو ساز خود را مطلع سازید.
۳. برای اطمینان از عدم بارداری در هنگام مصرف این دارو، از روش های پیشگیری از بارداری استفاده کنید.
۴. نگران ریزش موی خود نباشید، این عارضه پس از قطع دارو برطرف می گردد.
۵. برای کاهش تهوع و استفراغ، وعده های غذایی بیشتر با مقدار اندک، مصرف آبنبات های بدون قند یا جویدن آدامس های بدون قند می تواند کمک کننده باشد.
۶. در صورت علائم و نشانه های عفونت شامل تب ۳۸ درجه یا بالاتر، لرز، گلودرد شدید، درد گوش یا سینوس، سرفه، افزایش خلط یا تغییر رنگ آن ، دفع ادرار دردناک ، زخم های دهانی، زخم هایی که بهبود نمی یابند، خارش یا درد مقعد، تهوع یا استفراغ شدید، درد مفصل و التهاب، عدم توانایی در خوردن غذا، احساس خستگی شدید، بروز خونریزی غیر معمول یا کبود شدن پوست، تیره شدن ادرار، زردی پوست یا چشم ها و ایجاد هر گونه جوش در سطح پوست، به پزشک اطلاع دهید.
واحد آموزش به بیمار