



نام ژنریک: مونته لوکاست

نام تجاری: سینگولایر

مکانیسم دارو: گشاد کننده مجاری تنفسی - ضد آسم

مونته لوکاست

۱. در صورت عدم بهبود علائم و نشانه های بیماری، تورم شدید زبان صورت لب ها تنگی نفس شدید آبی شدن رنگ پوست و گیجی و خواب آلودگی به پزشک یا دارو ساز خویش اطلاع دهید.

۲. در صورت تنگی نفس و سرفه شدید، افزایش نیاز به اسپری های درمان کننده تنفس، علائم بروز افسردگی، افکار خودکشی، اضطراب و هیجان، تغییرات خلق و خوی شدید، افکار نادرست و عدم علاقه به زندگی به پزشک یا دارو ساز خود اطلاع دهید.

۳. دارو در درمان آسم عصرها، در آسم ناشی از ورزش ۲ ساعت قبل از ورزش و در درمان حساسیت و آلرژی به صورت مرتب در یک ساعت مشخص و ثابت از روز استفاده شود.

۴. در صورت بروز علائم مانند آنفولانزا مانند سردرد، ضعف، تب و افزایش تعریق در موارد خفیف می توان با دارو های ضد درد مانند استامینوفن درمان صورت گیرد و در صورت شدید بودن علائم به پزشک اعلام نماید.

واحد آموزش به بیمار

EDU-PT-252/A