



نام ژنریک: نیتروگلیسییرین

نام تجاری: سوستاک، نیتروکاردین

مکانیسم دارو: درمان آنژین صدری کاهش هنده فشار خون

نیتروگلیسییرین

۱. در صورت وجود تاری دید، خشکی دهان و سردرد پایدار گزارش دهید.
۲. فرم زیر زبانی را همیشه در دسترس داشته باشید.
۳. قرصهای خوراکی باید با معده خالی، ۳۰ دقیقه قبل یا ۱-۲ ساعت بعد از غذا مصرف شوند.
۴. از قطع ناگهانی دارو پرهیز نماید.
۵. از تغییر وضعیت ناگهانی خودداری نماید.
۶. سردرد عارضه شایع دارو است و در صورت شدت یافتن به پزشک معالج اطلاع دهید.
۷. در صورت وجود تاری دید، خشکی دهان و سردرد پایدار گزارش دهید.
۸. پس از مصرف سه قرص زیرزبانی در عرض ۱۵ دقیقه و عدم بهبودی درد به مرکز اورژانس مراجعه نمائید.
۹. قرص زیر زبانی نباید در معرض هوا، گرما و رطوبت قرار گیرد.

واحد آموزش به بیمار

EDU-PT-268/A