



نام ژنریک : اوفلوکساسین
نام تجاری : تارپوید
مکانیسم دارو : آنتی بیوتیک

اوفلوکساسین

۱. دارو را بیش از مقدار و مدت توصیه شده توسط پزشک مصرف نکنید و علی رغم احساس بهبودی دروه درمان را کامل نمایید.
۲. بهتر است دارو را با شکم خالی یک ساعت قبل یا ۲ ساعت بعد از غذا میل نمایید.
۳. از مصرف این دارو همراه با آنتی اسید های حاوی آلومینیوم ، منیزیم یا کلسیم خودداری کنید.
۴. قبل و بعد از استعمال قطره دارویی، دست ها را بشویید.
۵. تا ۱۵ دقیقه بعد از استعمال قطره چشمی از استفاده از لنز تماسی خودداری کنید.
۶. از تماس نوک قطره چکان با چشم یا اطراف آن خودداری کنید.

۷. پس از ریختن قطره گوشی در گوش، به سمت مقابل دراز بکشید تا گوش حاوی قطره رو به بالا قرار بگیرد.

۸. به هنگام مصرف قطره چشمی این دارو، اطراف چشم را تمیز کنید و بعد قطره را داخل چشم بچکانید.

۹. در صورتی که محدودیتی برای مصرف مایعات ندارید بهتر است طی دوره درمان با این دارو آب فراوان بنوشید.

۱۰. این دارو ممکن است موجب سرگیجه، منگی یا خواب آلودگی شود لذا هنگام انجام فعالیت هایی که نیاز به هوشیاری دارند احتیاط کنید.

۱۱. از قرار گرفتن در معرض نور خورشید، حین درمان با این دارو خودداری کنید.

۱۲. در صورت بروز هر نوع درد مفصلی، درد در ناحیه قوزک پا، کمر درد یا اشکال در تنفس بلافاصله به پزشک یا دارو ساز اطلاع دهید.

واحد آموزش به بیمار

EDU-PT-253/A