



نام ژنریک: پنتوپر ازول

نام تجاری: پنتوزول

مکانیسم دارو: داروی مهارکننده اسید معده و ضد زخم معده

پنتوپرازول

۱. در صورتی که از دارو به عنوان درمان زخم گوارشی استفاده می کنید، دوره درمان را کامل کنید و حتی در صورت بهبودی دارو را تا پایان دوره قطع نکنید.
۲. در صورتی که روزی یک بار از دارو استفاده می کنید دارو را یک ساعت قبل از صبحانه میل نمایید. در صورتی دارو ۲ بار در روز تجویز شده یک ساعت قبل از صبحانه و شام مصرف شود.
۳. مصرف بلند مدت دارو، در صورت تجویز پزشک و تحت نظر او بلامانع است.
۴. دارو را به صورت کامل مصرف کنید و قرص را نصف نکنید و یا نجوید.

۵. بیمار باید هریک از موارد زیر را به پزشک اطلاع

دهد:

- بارداری احتمالی یا ثابت شده
- تصمیم به بارداری
- شیر دهی یا تصمیم به شیر دهی
- تهوع و استفراغ
- اسهال شدید.

۶. در صورت عدم بهبود علائم و نشانه های بیماری،

تورم شدید زبان، صورت، لبها، تنگی نفس شدید،

آبی شدن رنگ پوست و گیجی و خواب آلودگی

شدید به پزشک یا دارو ساز خویش اطلاع دهید.

واحد آموزش به بیمار

EDU-PT-255/A