



نام ژنریک: فنی توئین

نام تجاری: دیلانتین

مکانیسم دارو: کنترل حملات صرع

فنی توئین

۱. جهت پیشگیری از تورم و خونریزی لثه ها، بهداشت دهان و دندان را رعایت کرده و مرتب ویزیت دندانپزشکی انجام شود.
۲. رنگ ادرار ممکن است قرمز، صورتی یا قهوه ای مایل به قرمز شود.
۳. در صورت وقوع تب، زخم در گلو، واکنشهای پوستی، خستگی، خشکی پوست، بهم شدن صدا و حرکات غیر قابل چشم و بدن و اختلال در نتایج فعالیت کبدی به پزشک مراجعه شود.
۴. از قطع ناگهانی دارو در پی مصرف طولانی مدت پرهیز شود. چون ممکن است احتمال تشنج را بالا ببرد.
۵. از مصرف الکل پرهیز شود.

۶. جهت کاهش تحریکات گوارشی دارو با غذا یا شیر مصرف شود.

۷. از آنجایی که این دارو با دیگر داروها تداخل داشته، قبل از مصرف هر داروی دیگر با پزشک مشورت نمایید.

۸. در صورت مصرف همزمان دارو با داروهای پیشگیری کننده بارداری، اثر داروی ضد بارداری تغییر می یابد لذا بهتر است از روش دیگری جهت جلوگیری استفاده شود.

۹. این دارو می تواند قند خون را افزایش یا کاهش دهد.

۱۰. بیماران تحت درمان طولانی مدت باید مصرف کافی و تماس با نور آفتاب کافی D غذاهای حاوی ویتامین داشته باشند.

واحد آموزش به بیمار

EDU-PT-272/A

یک قاشق غذاخوری معادل ۱۰ سی سی
یک قاشق مربا خوری معادل ۵ سی سی
یک قاشق چایخوری معادل ۲/۵ سی سی