



نام ژنریک: کلوییدوگرل

نام تجاری: پلاویکس

مکانیسم دارو: ضد تشکیل لخته

### کلوییدو گرل

۱. دارو را بیش از مقدار و مدت توصیه شده توسط پزشک یا دارو ساز مصرف نکنید.
۲. سعی کنید هیچ دوزی را فراموش نکنید.
۳. می توانید دارو را با غذا یا شکم خالی میل نمایید ولی در صورت احساس ناراحتی در مصرف دارو با شکم خالی ، همراه غذا میل شود.
۴. به دلیل احتمال خونریزی با مصرف این دارو، از انجام فعالیت هایی که ممکن است باعث آسیب یا خونریزی شود، خودداری نمایید و از مسواک نرم استفاده نمایید.
۵. در صورت بروز هر گونه خونریزی حین مصرف این دارو، فوراً به پزشک یا دارو ساز خود اطلاع دهید.
۶. دارو را هر روز در ساعت مشخصی میل کنید.

۷. این دارو با برخی از دارو های دیگر تداخل و ناسازگاری دارد قبل از استفاده از هر نوع فراورده شامل دارو های حاوی آسپرین، مسکن ها ، دارو های رقیق کننده خون، ایبو پروفن یا سایر دارو های مشابه، سیر، جین سینگ یا ویتامین E (ای) با پزشک یا دارو ساز خود مشورت کنید.
۸. در صورت نیاز به اعمال جراحی یا دندانپزشکی، حتما مصرف کلو پیدوگرل را به جراح یا دندان پزشکتان اطلاع دهید.
۹. در صورتی که استنت قلبی دارید، قبل از قطع کلوپیدوگرل به هر دلیل، به متخصص قلب خود اطلاع دهید.
۱۰. حین مصرف این دارو از مصرف نوشیدنی های الکلی خودداری کنید.

واحد آموزش به بیمار

EDU-PT-273/A