



نام ژنریک: پرد نیزولون

نام تجاری: نیزوپرد

مکانیسم دارو: کورتون - ضد التهاب

پردنیزولون

۱. از تغییر مقدار مصرفی دارو پرهیز شود. دارو بایستی به تدریج کم و سپس قطع شود.
۲. در صورت مشاهده تب، زخم گلو، درد عضلات، افزایش ناگهانی وزن، درد شدید شکمی و مدفوع سیاه رنگ به پزشک اطلاع دهید.
۳. مصرف غذاهای حاوی قند بالا و شور را محدود کرده و از غذاهای حاوی پتاسیم بالا مثل سیب زمینی، موز، پرتقال، نان و غلات، حبوبات و سبزیجات استفاده شود.
۴. بهداشت فردی را رعایت کرده و از تماس با افراد بیمار عفونی پرهیزید.

۵. بدون مشورت با پزشک از انجام هر گونه واکسیناسیون بپرهیزید.
۶. در صورت مصرف قرص های ضد بارداری پزشک خود را در جریان بگذارید..
۷. از انجام کارهای مستلزم هوشیاری کامل یا مهارتهای حرکتی بپرهیز شود.
۸. ممکن است واکنش های حساسیت به نور روی دهد از این رو توصیه می شود از مواجهه طولانی مدت با نور خورشید بپرهیز شود.
۹. بهتر است دارو با غذا یا شیر مصرف شود.
۱۰. خشکی دهان و خواب آلودگی و سرگیجه از عوارض دارو می باشد.
۱۱. به منظور کاهش عوارض، مصرف مایعات را افزایش دهید.

واحد آموزش به بیمار

EDU-PT-274/A