



نام ژنریک: پرومتازین

نام تجاری: فنرگان

مکانیسم دارو: آنتی هیستامین

پرومتازین

۱. در صورت عدم بهبود علایم و نشانه های بیماری، تورم شدید زبان صورت لب ها تنگی نفس شدید آبی شدن رنگ پوست و گیجی و خواب آلودگی به پزشک یا دارو ساز خویش اطلاع دهید.

۲. در صورت احتباس ادرار و خارش و تحریک شدید موضعی به پزشک یا دارو ساز خود اطلاع دهید.

۳. در اطفال کم تر از دو سال از دارو بدون نظر پزشک استفاده ننمایید .

۴. در پیشگیری از بیماری مسافرت دارو باید یک ساعت قبل از سفر استفاده شود و در صورت طولانی بودن سفر هر ۶ ساعت تکرار شود.

۵. این دارو ممکن است باعث خواب آلودگی شود لذا از رانندگی یا کارهایی که نیاز به هوشیاری دارند مانند کار با ماشین آلات خطرناک خودداری کنید.

۶. این دارو در بسیاری از داروهای که برای درمان سرماخوردگی مانند کلدستاپ و ضد سرفه (دیفن هیدرامین کمپاند) وجود دارد، بنابراین در صورت مصرف هر داروی سرما خوردگی با پزشک یا داروساز خویش مشورت نمایید.

۷. در صورت بروز یبوست از مایعات بیشتر و مواد غذایی حاوی فیبر مانند سبزیجات استفاده نمایید در صورت عدم رفع مشکل با پزشک یا دارو ساز در خصوص دارو های ملین مشورت نمایید.

۸. دارو ممکن است باعث خشکی دهان شود بهتر است برای درمان و پیشگیری از این مشکل آدامس بدون قند بجوید، آب نبات بدون قند مصرف نمایید و به بهداشت دهان و دندان توجه نمایید.

واحد آموزش به بیمار

EDU-PT-259/A