



نام ژنریک: ریفامپین

نام تجاری: ریفادین

مکانیسم دارو: آنتی بیوتیک

### ریفامپین

۱. دارو را به مقدار و مدت توصیه شده توسط پزشک مصرف کنید و رژیم درمانی خودو دوره ی طولانی درمان را کامل نمایید.

۲. در حین درمان با این دارو، آزمایش های دوره ای خود را طبق دستور پزشک انجام دهید.

۳. این دارو رنگ تمام مایعات بدن را به قرمز مایل به نارنجی تغییر می دهد. احتمال تغییر رنگ دائمی لباس ها و لنز های تماسی وجود دارد.

۴. در حین درمان با این دارواز مصرف نوشیدنیهای الکلی خودداری کنید.

۵. در صورت بروز هر گونه علایمی از قبیل خونریزی یا کبودی غیر طبیعی، خستگی، ضعف، تهوع، استفراغ، تیره شدن رنگ ادرار، زرد شدن چشم ها و یا بروز علائم شبه انفلانزا به پزشک معالج خود اطلاع دهید.

۶. بهتر است دارو را با شکم خالی ، حداقل یک ساعت قبل یا دو ساعت بعد از غذا میل نمایید.

۷. برای کسب بهترین پاسخ سعی کنید هیچ دوزی را فراموش نکنید .

۸. علی رغم احساس بهبودی دوره درمان را کامل نمایید.

۹. ممکن است حین درمان با این دارو قرص های ضدبارداری خوراکی اثر بخشی کافی نداشته باشند. لازم است جهت جلوگیری از بارداریاز روش دیگری استفاده شود.

واحد آموزش به بیمار

EDU-PT-261/A