



نام ژنریک :سالبوتامول

نام تجاری :ونتولین، و نتولکس

مکانیسم دارو :گشاد کننده های برونش و داروهای ضد آسم

سالبوتامول

۱. در صورت مصرف توام سالبوتامول استنشاقی با دیگر داروهای استنشاقی دیگر دارو به فاصله ۱۵ دقیقه از یکدیگر مصرف شوند تا احتمال بروز مسمومیت کاهش یابد.
۲. افشانه دهانی یا بینی را دور از شعله یا حرارت نگه دارید.
۳. افشانه را سوراخ نکرده و درون آتش نیاندازید.
۴. جهت پیشگیری از خشکی دهان و حلق، بعد از استفاده از دارو دهان خود را با آب بشویید.
۵. دارو را بیش از حد مجاز مصرف ننمایید.
۶. از تماس محتویات اسپری با چشم خودداری شود.
۷. این دارو ممکن است سبب بروز سرگیجه شود، لذا از کارهای حساس و دقیق مانند رانندگی بپرهیزید.
۸. قبل از مصرف دارو تکان داده شود.
۹. در کودکان کمتر از ۸ سال از وسایل حجم دهنده مانند آسم یار، دم یار و آسان نفس استفاده شود.
۱۰. در صورت حساسیت به دارو مانند تنگی نفس شدید، آبی رنگ شدن پوست، گیجی و خواب آلودگی شدید و خارش به پزشک اطلاع دهید.

واحد آموزش به بیمار

EDU-PT-277/A