



نام ژنریک: سیمواستاتین
نام تجاری: زوکور
مکانیسم دارو: کاهش دهنده چربی خون

سیمو استاتین

۱. دارو را شب ها مصرف کنید.
۲. رژیم غذایی و فعالیت بدنی را طبق دستور پزشک انجام دهید.
- ۳ می توانید دارو را با غذا یا شکم خالی میل نمایید در صورت ایجاد ناراحتی گوارشی این دارو را با غذا مصرف کنید.
۴. در صورت وجود بیماری فعال کبدی یا افزایش آنزیم های کبدی از مصرف دارو خودداری کنید.
۵. اگر باردار هستید یا ممکن است باردار باشید و یا در دوران شیر دهی هستید از مصرف دارو خودداری کنید.
۶. کلستیرامین را با فاصله حداقل ۴ ساعت از سیمواستاتین مصرف کنید.
۷. از مصرف گریپ فروت یا آب آن خودداری کنید.
۸. از مصرف الکل خودداری کنید.
۹. پوست شما به راحتی دچار آفتاب سوختگی می شود از قرار گرفتن در معرض آفتاب یا نورهای شدید خودداری کنید. از عینک آفتابی استفاده کرده و لباس بسته بپوشید و از ضد آفتاب استفاده کنید.
۱۰. در صورت در شدید عضلانی یا ضعف، علائم شبه سرماخوردگی خون ریزی های غیر معمول یا کبودی پوست، تیره شدن ادرار، زردی پوست یا چشم ها، ایجاد هر گونه جوش در سطح پوست، به پزشک اطلاع دهید.

واحد آموزش به بیمار

EDU-PT-262/A