



نام ژنریک :سوتالول  
نام تجاری:بتاپیس  
مکانیسم دارو :درمان بی نظمی قلبی

## سوتالول

۱. دارو را با غذا یا شکم خالی می توانید میل نمایید در صورتی که مشکل گوارشی دارید آن را با غذا میل کنید .
۲. این دارو نباید به طور ناگهانی قطع گردد. قطع ناگهانی دارو می تواند به شما آسیب بزند.
۳. دندانپزشک جراح و یا هر کدام از افراد کادر پزشکی را از مصرف داروی سوتالول مطلع سازید.
۴. این دارو با برخی از دارو های دیگر تداخل و ناسازگاری دارد . اگر دارو های دیگری مصرف می کنید به پزشک یا دارو ساز خود اطلاع دهید .
۵. این دارو می تواند در هوشیاری شما تغییر ایجاد کند قبل از اینکه تاثیر دارو بر شما مشخص شود از انجام کارهای که نیاز به هوشیاری دارد(مانند رانندگی ) پرهیز کنید.
۶. همه علائم افت قند در بیمار مبتلا به دیابت غیر از تعریق ممکن است در اثر مصرف سوتالول هنگام افت قند خون مخفی شود.

واحد آموزش به بیمار

**EDU-PT-263/A**