



نام ژنریک: لووفلوکساسین

نام تجاری: تاوا نکس

مکانیسم دارو: آنتی بیوتیک

تاوانکس

۱. در افراد زیر ۱۸ سال به دلیل پارگی تاندون، آشیل و اختلال در اعصاب مرکزی منع مصرف دارد.
۲. این دارو برای افرادی که دچار نوعی از بینظمی ریتم قلب هستند و یا سطح پتاسیم خون آنها پایین است منع مصرف دارد.
۳. در صورت بروز اولین نشانه واکنشهای حساسیتی و یا راش پوستی، مصرف دارو باید قطع گردد.
۴. در صورت بروز تشنج، مصرف دارو باید قطع گردد.
۵. این دارو در افراد بالای ۶۰ سال با احتیاط فراوان باید مصرف شود.
۶. افرادی که ناراحتی گوارشی دارند بهتر است این دارو را همراه غذا و مایعات فراوان میل نمایند.
۸. مصرف مداوم و مکرر این دارو ممکن است شما را مستعد عفونتهای قارچی دهان و همچنین برفک دهان نماید. در صورت مشاهده هر گونه ناحیه سفید رنگ و یا غیر طبیعی در دهان خود به پزشک خود مراجعه نمایید.
۹. در صورتی که شما سابقه حساسیت دارویی به این دارو یا داروهای مشابه سیپروفلوکساسین دارید بایستی قبل از مصرف این دارو پزشک خود را مطلع نمایید.

۱۰. در صورتی که این دارو بر روی بینایی شما اثر می گذارد یا موجب خواب آلودگی شما می شود از رانندگی پرهیز نمایید و از وسایل نقلیه عمومی استفاده نمایید.
۱۱. در حین مصرف دارو از مصرف الکل پرهیزید.
۱۲. اگر یک نوبت را فراموش کردید، به مجردی که به یاد آورید مصرف کنید. البته اگر تقریباً موقع نوبت بعدی رسیده است، نوبت فراموش شده را رها کرده و به برنامه منظم داروویتان برگردید. مقدار دارو را دو برابر نکنید.
۱۳. مصرف این دارو در بارداری توصیه نمی شود. بنابراین در صورتی که شما حین استفاده از این دارو باردار شده اید یا قصد بارداری دارید، موضوع را با پزشک خود در میان بگذارید و با وی درباره مصرف این دارو مشورت نمایید.
۱۴. این دارو می تواند از طریق شیر مادر به نوزاد یا شیرخوار منتقل شود. بنابراین در دوران شیردهی با احتیاط باید مصرف شود.
۱۵. در صورت ایجاد واکنشهای آلرژیک، دارو باید بلافاصله قطع شود و به پزشک خود اطلاع دهید.

واحد آموزش به بیمار

EDU-PT-280/A