

## آپیکسابان

آپیکسابان جزو داروهای ضد انعقاد خون بوده و خون را رارقیق می کند و باعث می شود خون بتواند به راحتی در عروق خونی گردش کند. این امر بدین معنا است که مصرف این دارو ریسک لخته شدن خون را به حداقل می رساند. از این دارو برای درمان آن دسته از بیمارانی استفاده می شود که به علت لخته شدن خون دچار بیماریهایی از قبیل سکته مغزی، حمله قلبی یا ترومبوز عمیق وریدی یا آمبولی ریوی شده اند.

## موارد احتیاط و منع مصرف قرص آپیکسابان

- در صورتی که به آپیکسابان یا هر گونه داروی دیگر مشابه حساسیت دارید.
- در صورتی که باردار هستید یا قصد باردار شدن را دارید زیرا این دارو می تواند برای جنبین خطروناک باشد.
- در دوران شیردهی تنها در صورت ضرورت قابل استفاده است.
- در صورتی که دچار مشکلات کبدی هستید.
- در صورتی که به تازگی، عمل جراحی ستون فقرات یا هر گونه عمل جراحی انجام داده اید.

## تداخلات دارویی آپیکسابان

صرف همزمان این قرص با داروهای زیر ممکن است تداخل دارویی ایجاد کند:

- داروهای ضدانعقاد خون مانند وارفارین، آسپرین، هپارین، کلوبیدوگرل
- داروهای ضدالتهابی غیراستروئیدی مانند ناپروکسن و ایبوپروفن
- برخی داروهای صرع و حملات تشنجی مانند کاربامازپین و فنی توئین
- داروهای عفونت قارچی مانند کتوکونازول، ایتراکونازول و ریتوناویر
- داروهای کاهش دهنده لخته خون مانند انوکسپارین
- داروهای فشار خون یا داروهای قلبی مانند وراپامیل و دیلتیازم
- داروهای ضدافسردگی
- بیماری‌های خاص قلبی مانند درد قلبی ناپایدار یا درد قلبی پس از عمل جراحی
- بیماری‌های خاص عروقی مانند سکته قلبی اخیر، سکته مغزی اخیر، یا عروق کرونری (مربوط به عروق قلب)
- در صورتی که از داروهای دیگری مانند وارفارین استفاده می کنید که بر لخته شدن خون اثر می گذاردند.
- در صورتی که دچار هرگونه آسیب دیدگی شده اید و به تازگی خونریزی بسیار زیادی داشتید مانند زخم شدن یک ناحیه از بدن یا وجود زخم معده.
- در صورتی که از مکمل های گیاهی استفاده می کنید که اغلب برای افسردگی مورد استفاده قرار می گیرد.
- در صورتی که دچار سندروم آنتی فسفولیپید هستید که این اختلال بر سیستم ایمنی بدن تاثیر می گذارد و ریسک لخته شدن خون را افزایش می دهد.
- مشکلات جدی در کبد مانند بیماری کبدی مزمن یا افزایش بیش از حد آنزیم‌های کبدی خونریزی فعلی در بدن مانند خونریزی شدید داخلی یا خارجی
- مصرف همزمان با داروهایی که ممکن است با آپیکسابان تداخل داشته باشند مانند داروهای ضد پلاکت خون (مثل آسپرین) یا داروهای ضد انعقاد



دانشگاه علوم پزشکی شیراز



مرکز آموزشی درمانی شهید دکتر فقیه‌ی

## آپیکسابان و نکات آموزشی مربوطه

ویژه آموزش به بیمار

### تهیه کننده:

فروغ قوی پنجه- کارشناس پرستاری  
افسون توفیق- کارشناس ارشد پرستاری

### تایید کنند: ۵

دکتر حامد بذرافشان- متخصص قلب و عروق

### منابع:

دارونامه رسمی ایران ۱۴۰۲  
وزارت بهداشت

تابستان ۱۴۰۳

EDU-PT-310/A

### توجه داشته باشید:

- دارو را از نور ورطوبت دور نگه دارید.
- به محض به خاطر آوردن دوز فراموش شده هر چه سریع تر آن را مصرف کنید مگر آنکه زمان مصرف دوز بعدی فرا رسیده باشد.
- در صورت فراموش کردن یک دوز دارو از دو برابر کردن آن در وعده بعدی خودداری کنید و پس از آن داروی خود را به صورت طبیعی مصرف نمایید.
- باید هر روز آپیکسابان را سر ساعت مشخص بخورید.
- در هنگام مصرف آپیکسابان به هیچ عنوان از روش‌های گیاهی از قبیل مصرف گل راعی به منظور درمان افسردگی استفاده نکنید زیرا ریسک بروز عوارض جانبی را افزایش خواهد داد. برای اطمینان بیشتر و افزایش سطح ایمنی و سلامت بدن خود قبل از استفاده از سایر داروها از قبیل مکمل گیاهی انواع و بتامین باید با پزشک خود مشورت کنید.
- ۲۴ تا ۴۸ ساعت قبل از انجام عمل جراحی طبق نظر پزشک معالج، مصرف قرص (آپیکسابان) را متوقف کنید.

### چه موقع باید به پزشک مراجعه کرد؟

- در صورتی که دچار راش پوستی شده اید و علائمی از قبیل خارش پوست، قرمزی پوست، تورم، تاول یا پوسته ریزی دارید.
- در صورت تنگی نفس
- تغییر در ضربان قلب
- اگر دچار سفتی و گرفتگی قفسه سینه یا گلو شده اید.
- اگر برای صحبت کردن یا نفس کشیدن مشکل دارید.
- اگر دهان، صورت، لب، زبان یا گلوی شما در حال متورم شدن است
- زردی پوست یا چشم
- وجود خون در ادرار یا سیاه شدن مدفوع
- خونریزی از بینی
- تهوع